

千金要方

附衍義
江左書林印



Chinese

Vol. 11

V. 2 - V. 3

婦人方上凡九類

求子第一

論六首
灸法六首

方一十五首
轉女為男法三首

論曰夫婦人之別有方者以其胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五臟虛實交錯惡血內漏氣脈損竭或飲食無度損傷非一或瘡瘻未愈便合陰陽或便利於懸厠之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也惟懷胎妊而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂患蒸著堅牢情不自抑所以為病根深療之難瘥故養生之家特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機處育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免於夭枉者哉故傳母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也 論曰人之情性皆願善已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日脣爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉 論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相剋及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方選諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳相親宿日法時日推主中卷 論曰凡人無子當為夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所致故有絕嗣之患夫治之之法男服七子散

女服紫石門冬圓及坐藥盪胞湯無不有子也

七子散 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方 五味子 鍾乳粉 牡荊子 兔然子 車前

子 藉藟子 石斛 乾地黄 薯蕷 杜仲 鹿茸 遠志 附子 蛇床子 芎藭 山黃

天雄 人參 茯苓 黃耆 牛膝 桂心 旋覆 巴戟 天 右二十四味治下節

酒服方寸七日二不知增至二七以知為度禁如藥法不能酒者蜜和圓服亦得○一方加覆盆子八

銖求子法一依後房中篇

衍義 萬類稟乎乾健務資化生千金體乎造物首推廣嗣廣嗣一門又以七子散為基始專主丈夫

風虛目暗精氣衰少夫所謂風虛者肝氣內虛而顯風木之象目暗者腎氣不充水精不能上注於目

也故欲求廣嗣先培根本此方專為慇懃精薄陽氣不振者設參耆鹿茸方中君主精不足者補之以

味也鍾乳雄附方中主帥形不足者溫之以氣也參芪溫厚非雄附不能激之鍾乳慄悍非鹿茸無以

濡之巴戟旋覆五味山黃兔然薯蕷杜仲牛膝乃參耆之匡輔務冀蛇床桂心遠志則雄附之寮佐然

無陰則陽無以化地黃芎藭不特化氣成形并化胎息蘊毒制劑之妙無以喻之至於牡荊專主風虛

車前職司氣化壯荊勢紛石斛監之車前力薄茯苓助之以其襄既濟之功克紹廣嗣之勛允為慇懃

精薄之金鑄第溫補助陽不過為廣嗣之一端設陰精內涸陽氣未漓雄附似可勿用地黃何妨量加

且有膏梁體豐酒客濕著濁疾脂膩支塞中外精氣不純不能生育者亦有好餌丹石毒溢骨空精氣

灼爍不能施化者復有急於子嗣愈補則氣愈壅愈溫則陽愈痿又須二陳平胃滋腎洗滌髓室則生

生之機自裕如矣讀古人方須要識古人手眼如上等法足補七子散之未逮也

朴消盪胞湯 治婦人立身已來全不產及斷緒久不產三十年者方 朴消 牡丹 當歸 大黃

桃仁 厚朴 桔梗 人參 赤芍 茯苓 桂心 甘草 牛膝 橘皮 附子 六味 蟲蟲

物使然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大因不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可服酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥桔板甘草不用

衍義

土中有石則草不生渠中有阜則水積阻婦人立身不產斷緒不孕皆子藏有瑕之故非峻用

決渠開荒力量雖日從事調經丸泥補天術耳方中硝黃蟲蛙決渠之槌鑿也桂心附子鉏荒之力士也人參茯苓開疆之糧餉也桔板厚朴藥中宣使病在下取之上也其餘牡丹赤芍等味皆供驅役之流此方專滌胞門積血故以抵當為主而兼下瘀血湯桃核承氣之製其力專矣猶恐積垢難動又需參附之大力直搗長驅何憚堅壘不破耶服後復取微汗不獨迅掃諸內并以開發元府宣通中外化機勃發生氣裕如但藥力過峻須防瞑眩乃預擬酸收之法可無倉卒之虞然必天陰臍下疼痛方為瘀血之確徵而婦人不孕詎止一端多有坤體肥盛濕墮子藏不能攝精者亦有土氣瘠薄火灼精枯不能數化者亦有交接過勞關闕廢弛而失閉藏之令者不特上方無預導法尤難藥施夫病有常變藥有變通若以常法治變則與圓柄方鑿何異哉

治全不產及斷緒服前朴消湯後著坐導藥方

各二

大黃

礬石

戎鹽

千金翼

蜀椒

各半

十味

為末

以絹袋盛大如指長三寸

盛藥令滿內

有子若未見病出亦可至十日安之一本別有等應砒霜各半兩此藥為服朴消湯恐去冷惡物出不

盡以導藥下之值天陰冷不疼不煩著導藥亦有著鹽為導藥者然不如此藥其服朴硝湯後即安導

藥經一日乃服紫石門冬丸

衍義

坐導之法乃蜜煎膽導土瓜根導之變法東垣方中亦常有之然有其藥而無其用姑存以備

立法可也

紫石門冬圓

治全不產及斷緒方

紫石英

天門冬

各三

當歸

芎藭

紫葳

春栢

桂心

頭 乾地黄

牡蒙

外臺作牡蒙

禹餘糧

石斛

辛夷

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝

各三

柏子仁

薯蕷

烏賊骨

甘草

兩半

右二十六

味為末

蜜

和丸如梧子大酒服十九日三漸增至三十九丸以腹中熱為度不禁房室夫行不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠

衍義

天地網緼萬物化生之機務在水上之精純自然庶幾繁茂方中人參甘草芎藭地黄山

藥寄生川斷牡丹調養氣血之味庸所易知其石英餘糧溫固下元且佐桂薑為黃母乃失之過熱天

冬卷柏性稟至陰如何可任廣嗣之用因諦本經天門冬有強骨髓之說別錄言冷而能補甄權治一

切惡氣不潔之疾卷柏主女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子乃知二味配合石英餘糧有既濟陰陽之

妙其溫養氣血之味上法矣而溯洄窮源又須子藏精純生生之氣方得裕如細辛辛夷專滑子藏

風氣烏賊牛膝紫葳牡蒙專散胞門瘀積石斛專清胃氣厚朴專泄腸垢柏子仁專滋心腎益肝氣久

服令人潤澤美色以婦人之病每多風襲胞門血汗子藏故細辛以下諸味千金恆有之此方較補益

門中紫石英天門冬丸大都髣髴彼以風冷在于宮子常墮落此以立身不產斷緒不孕子藏原無固

冷故不需石南雲母輩峻溫也

白薇圓

主令婦人有子方

白薇

細辛

防風

人參

秦椒

白飯

一作桂心

牛膝

秦光

蕪荑

沙參

芍藥

五味子

白礬

牡蛎

乾地黄

白石英

鼠婦

水蛭

蟲蟲

各十

吳茱

芎藭

各三

桃仁

紫石英

各一

兩

鍾乳

乾地黄

白石

英

鼠婦

半兩

水蛭

蟲蟲

各十

芎藭

各三

桃仁

紫石英

各一

兩

鍾乳

乾地黄

白石

英

鼠婦

半兩

水蛭

蟲蟲

各十

芎藭

各三

桃仁

紫石英

各一

兩

鍾乳

乾地黄

白石

英

鼠婦

半兩

水蛭

蟲蟲

各十

有所去小覺有異即停服○又方 治婦人久無子或斷緒上熱下冷百病皆治之方 白薇 乾地

黃龍薑 車前子 蜀椒 八分 紫石英 藥本 石膏 卷蘭子 卷柏 十兩 澤蘭 赤石脂 白
龍骨 遠志 麥門冬 茯苓 太乙餘糧 兩 當歸 芎藭 蛇床子 兩 白芷 覆盆子 桃仁
人參 兩半 桂心 蒲黃 兩半 細辛 三兩 橘皮 半兩 右二十八味為末蜜和丸如梧子大酒服十五

九日再漸增至四十九以知為度亦可至五十九慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉等覺有娠即停三
月正擇食時可食牛肝及心至四月五月不須但不可故殺令子短壽遇得者大良

衍義 本經白薇專主風熱不言婦人諸治金匱安中益氣竹皮丸治婦人產中虛煩嘔逆雖主胎產

實治風熱也而別錄有瘰癧中淋露下水氣等說所以婦人胎產方多用之同芍藥治婦人胎前產後
遺尿斯非利水之驗歟此白薇丸前後二方一主血結胞門子戶不淨不能成孕故用蠱蟲水蛭蟪蟪

鼠婦乾漆桃仁等一派峻攻積血之藥參入石莖參附桂薑椒黃大溫子藏左以芎藭牛膝牡丹芍藥
和血之味白薇沙參卷柏柏仁化諸辛熱細辛防風秦光蕪蕪散諸風氣白欬清理帶下蠶蠶除風

痰五味收斂陰精懷頭反者取繼續宗桃之義兼能破除瘀血也又方專主上熱下冷子宮虛寒不能
攝精於前方除去破血峻劑僅用十味配入餘糧石脂龍骨蛇床遠志覆盆佐石莖人參薑椒桂心以

固下冷地黃門冬車前石膏茯苓橘皮佐卷柏白薇以清上熱薑本白芷細辛佐菴蘭澤蘭以散風熱
芎歸蒲黃佐桃仁以散血滯雖不若前方之專行破血溝渠之中豈無瘀垢存焉此千金立法之綱旨也

金城太守白薇圓 治月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子方 白薇 細辛 各三人參
杜蘅 古今錄寶 牡蒙 厚朴 半夏 白蠶蠶 當歸 紫苑 各八兩 牛膝 沙參 乾薑 秦苑 各

兩 蜀椒 附子 防風 各半 右十七味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸不知可增至四五丸此
藥不可常服覺有娠即止用之大驗 崔氏有桔梗丹

衍義 此方較前二方稍平僅取前方中參附椒薑以溫血氣白薇沙參以化辛熱辛防秦苑以祛血
室之風牛膝當歸以和衝脉之血蠶蠶以滌子戶風痰一切攻血之藥與入方固脫之劑總無預焉加

杜蒔者師甄權之破留血也加牡蒙紫苑者法本經之下逆氣及胸中寒熱結氣也逆氣下結氣散而血行無滯風氣去痰氣除而子藏安和故用半夏厚朴蠶蠶專行清理風痰濕滯并上二方為鼎峙三法隨人稟氣病氣而為取裁破血如無首方固脫莫若次法搜滌脂膩此方為最所以服之匝月便能

有子

論曰古者求子多用慶雲散承澤丸今代人絕不用此雖未試驗其法可重故述之

慶雲散

治丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子

五味子

各一

兔絲子

二升

天雄

斛

白朮

各三

桑寄生

四兩

天門冬

二兩

紫石英

二兩

右九味

治下

耐冷者

去寄生

加細辛

四兩

陽氣不少而無子者

去石斛

加檳榔

十五枚

良

承澤圓

治婦人下焦

三十六痰

不孕絕產方

梅核仁

辛夷

各一

葛上亭長

七枚

搜疏

三兩

兩澤瀉

子五合

右六味

為末蜜丸

如大豆

先食服

二九日

三不知

稍增之

若腹中無堅癖積聚者去

亭長

加通草

一兩

惡甘者

和藥先以苦酒搜散

乃內少蜜和為丸

衍義

慶雲者慶雲龍之微兆

承澤者承雨露之沾私也

慶雲丸以紫石英專溫榮血

天雄峻煖精氣

佐以覆盆五味兔絲溫補下元

寄生主治腰痛

天冬能強腎氣

石斛強陰益精

白朮固津氣而利腰膝

間血恐英雄二味之性過烈

乃以天冬石斛寄生濡之

陽施化之功盡矣

若素不耐寒

則去寄生而加細辛

以鼓生陽之氣

陽本不衰當退石斛而進檳榔

以祛濁濕之垢

其法之可重端在乎此

承澤圓專破子藏積血

子藏屬衝脈緊附厥陰

而主風木故取

梅仁之酸平以泄厥陰風熱

則亭長方得振破血之威

辛夷

本搜疏

三味

本經一治寒熱風頭痛

一主婦人陰中寒腫痛

一止遺溺利水道

更用澤瀉之子

統理婦人三十六病

一舉而內外風氣悉除

胞戶積血盡掃獨是梅仁之旨難

以領悉觀本草治倒吳普言明目益氣

孟詵言除煩熱目非肝腎所

主之

酸非風木所化

十二歎近世但言烏梅收津而不知梅仁之功用也

惜哉方後有云腹無堅積

則去亭長而易通草其虛實權變輕重天淵丸用苦酒正恐亭長性屬服後令人火煩勝于秦鍾離之

大黃圓 治帶下百病無子服藥十日下午血二十日下長蟲及青黃汁二十日病除五十日肥白方 大

黃碎如米豆 柴胡 朴硝煨 乾薑各一 芍藥五兩 蜀椒二兩 茯苓如雞子 右七味為末蜜和丸如桐

子大先食服七丸米飲下加至十九丸以知為度五日微下

行義 此治婦人帶下百病無子故用大黃朴硝熬煨以散積血即用乾薑蜀椒以溫子藏柴胡升發

生氣芍藥清理榮血茯苓引領硝黃專行滲道與後養胎令易產方蒸大黃丸用法相仿

吉祥圓 治女人積年不孕方 天麻 柳絮 牡丹 茯苓 乾地黃 桂心各一 五味子 桃花

白木 芍藥各二 覆盆子 一斗 桃仁一百枚 兔絲子 楮實子各一 右十四味為末蜜和丸如豆大空

心苦酒下五丸日中一服晚一服

行義 桃花令人好顏色柳絮能除面熱黑斯亦閨人之所需其地黃芍藥椿實養血壯筋免熱覆盆

五味補精益氣牡丹桂心桃仁和榮煖宮茯苓白木天麻清痰逐濕飲用苦酒取酸收以歸子藏也

硝石大黃丸 治十二癥瘕及婦人帶下絕產無子并服寒食藥而腹中有癖者當先服大丸下之乃服

寒食藥不下水穀但下病耳不至令人虛極方見十三卷中

秦椒圓 治婦人絕產生來未產滯滌腑臟使玉門受子精方 秦椒 天雄各八 元參 人參 白欬

鼠婦 白芷 黃耆 桔梗 露蜂房 白殭蠶 桃仁 蟬蛻 白薇 細辛 蕪荑各一 牡蒙

沙參 防風 甘草 牡丹皮 牛膝 卷柏 五味子 芍藥 桂心 大黃 石斛 白朮各三

附子各二 鍾乳半兩 水蛭七枚 蠱蟲各一百枚 麻布叩頓頭 煨七 右四十四味為末蜜和丸如梧子大酒

服十九日再稍加至二十九若有所去如豈汁鼻涕此是病出覺有異即停

衍義 此即第一方白薇圓之立法方中附子不逮蓋以天雄白朮蟲鼠婦不逮蓋以蜂房以蜂房能治崩中漏下五色又解鍾乳白朮相反之毒蘇頌所謂下乳石毒也

灸法

婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸 婦人絕子不生胞門閉塞灸關元三十壯報之 婦人妊子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯關元左邊二寸是也右邊二寸名子戶 婦人絕嗣不生灸氣門穴在關元傍三寸各百壯 婦人子藏閉塞不受精疼灸胞門五十壯 婦人絕嗣不生漏赤白灸泉門十壯三報穴在橫骨當陰上際 論曰陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所會則多生女但妊娠二月名曰始膏精氣成於胞裏至於三月名曰始胎血脉不流象形而變未有定儀見物而化是時男女未分故未滿三月者可依藥方術轉之令生男也

丹參丸 治婦人始覺有孕養胎并轉女為男方 丹參 川斷 芍藥 白膠 白朮 柏子仁 甘

草 各二兩 人參 芎藭 乾薑 各三兩 吳茱萸 橘皮 當歸 各一兩 白芷 冠縷 燒灰 各半 乾地黃 半 蕪

荑 針十八 犬卵 針一具 東門上雄雞頭 一枚 右十九味為末蜜和丸如梧子大酒服十九丸日再稍加至二

十九丸

衍義 陰陽造化之機得之資始轉女為男之說得不無疑此方出之千金量非誕妄方中理中四物

培養血氣芷蕪丹續祛風和榮白膠有散瘀止血之功柏仁有除風潤燥之力用犬卵者取其資壯元

陽雞頭者專取東方生氣冠縷沾日月光華為男子章身之具用以入藥以類感也然必未滿三月混

沌未分服之庶免有濟常見雞抱卵時以斧置窠令刃向下則匹雛盡雄術之靈幻又不得不信也

又方 取原蠶屎 一作十枚并花水服之日三〇又方 取弓弩絃一枚絳囊盛婦人左臂一法以繫

腰下滿百日去之〇又方 取雄黃一兩絳囊盛帶之要女者帶雌黃〇又方 以斧一柄於產婦臥

論曰何以知婦人妊娠脉平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉動甚者妊子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按之不絕法妊娠也三部脉沉浮正等按之無絕者有娠也 妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也 妊娠四月欲知男女者左疾為男右疾為女左右俱疾為產二子又法左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實生二男俱浮大生二女尺脉若左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如寶狀又法左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女若來而斷絕者月水不利又法左右尺俱浮為產二男不然女作男生俱沉為產二女不爾男作女生又法得太陰脉為男得太陽脉為女太陰脉沉太陽脉浮又遺妊娠人面南行還復呼之左迴首者是男右迴首者是女又婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女 妊娠欲知胎產者懷妊離經其脉浮設復痛引腰脊為今出也但離經者不病也又法欲生其脉離經夜半覺痛日中則生也 論曰凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有淡水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常但苦沈重憤悶不欲飲食又不知其患所在脉理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲飲食惡聞食氣欲嘔酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臟藏氣不宣通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脉不通經絡否澀則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸淡水消除便欲食也既得食力體強氣盛力足養胎母便健矣古今治阻病方有十數首不問虛實冷熱食少殆死者活於此方

半夏茯苓湯

治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩體重四肢百節疼煩沉重多臥少起惡

寒汗出疲極黃瘦方

半夏

生薑

各三錢

乾地黄

茯苓

橘皮

旋覆花

細辛 人參 芍藥

芎藭 桔梗 甘草^{各二銖} 右十二味吹咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者去地黃加桂心十二銖若食少胃中虛生熱大便閉塞小便赤少者去地黃加大黃十八銖黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方調定更服一劑湯使急服茯苓丸令能食便強健也忌生熱醋滑油膩松菜海藻

行義 妊娠惡阻良由母氣不充精微崇於胎息水穀之氣不能孚化蘊積而為痰涎汪洋沃於心下而致嘔逆因始在胎息將成時吸取母氣過甚則其阻彌劇調適之法惟以健運豁痰為首務方用人參鼓蠱二陳之製以運痰止嘔兼旋覆枳梗以升散結氣芎芍地黃以保護榮血用細辛者協濟芎地以開血分經脈竅通之邪也倘服後煩熱下痢或二便閉塞是必兼理客氣其加桂心加大黃當效前大黃圓及後方茯苓丸之製要常言桂不傷胎且熱令黑則專散氣而無壯火食氣之患大黃熱黑但能泄熱而無苦寒傷中之虞世俗每謂半夏辛散胎未成形時為之切禁若妊娠肥感多痰者不去其痰則胎不安癰瘡多火者不清其火則胎不穩時師或謂黃芩白朮為安胎專藥孰知半夏大黃桂心有安胎妙用乎應龍千金論云每以大黃同薑桂任補益之用人參協硝黃佐克敵之功不由千金之門何以求應變之策耶

茯苓圓 治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即效先服半夏茯苓湯兩劑後服此方 茯苓 半夏 桂心 乾薑^{各一兩} 白朮^{二兩} 橘皮^{一兩} 人參^{一兩}

兩 薑根 甘草 枳實^{各二兩} 右十味為末蜜和丸如梧子大飲服二十九漸加至三十九日三不用後

乾薑半兩 橘皮白朮各一兩 枳實二兩

行義 此方合理中六君枳朮桂苓等湯統以健脾運痰為務妙用尤在薑根一味鼓舞胃中清陽之氣生津止嘔不致嘔積汪洋七味白朮散之發源本此久須先服半夏茯苓湯者飲賴細辛以搜邪散

治地黃等以保胎息也

青竹茹湯 治妊娠惡阻嘔吐不下食方 青竹茹 橘皮各半 茯苓 生薑各一半 夏三十 右五味

嘔吐以水六升煮取二升半分三服不瘥頓作

衍義 二陳湯滌痰止逆之專藥也猶嫌甘草之助滿乃易竹茹之涼潤既清膈上稠痰復解胎急

熱一舉而兩得之矣

橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食方 橘皮 竹茹 人參 白朮各半 生薑二兩 厚朴半 右六味

咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重作

衍義 此本金匱橘皮竹茹湯於中裁去大棗甘草加入白朮厚朴變止嘔為止嘔其機用之靈活如

此惡阻諸治無逾以上數法也

養胎第三 論二首 方三十三首 逐月養胎二十首

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子
威德大師觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處閑靜割不正不食席不正不
坐彈琴瑟調心神和性情節嗜慾廢事清淨生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教也 論
曰兒在胎日月未滿陰陽未備臟腑骨節皆未成足故自初訖於將產飲食居處皆有禁忌 妊娠食羊
肝令子多厄食山羊肉令子多病 妊娠食驢馬肉令子延月食驢肉難產 妊娠食兔肉令子無聲音
并缺唇 妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡 妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲 妊娠食蟹并鴨子令
子倒出心寒 妊娠食鵲肉并豆醬令子滿面多野黯黑子 妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不長羞
恥 妊娠食蟹令子項短 妊娠食冰漿絕胎 妊娠勿向非常地大小便必半產殺人
徐之才逐月養胎方

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥母食腥辛是謂繞正 妊娠一月足履陰脉養不可針

矣其經如大數行開大衝中封足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事寢必安靜無令恐畏 妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雞雞丸

烏雞雞湯方 烏雞雞一隻治茯苓 阿膠各二 吳茱萸一升 麥門冬五合 人參 芍藥 白朮各三 甘草 生薑各一 右十味咬咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升內酒三升并膠烱

盡服三升放溫每服一升日三

行義 足厥陰寒東方生發之氣合衝脉而主血海專司胎息化機設不慎而見腰痛腹滿胞急卒有所下不得不藉血肉之味以安之雞屬巽而主肝血取其牝以助母氣黑以滋腎血也然血肉性緩非藉參苓朮草陽生之力則膠芍豈能速應其用茱萸門冬各有二義茱萸辛溫不特引諸藥入肝兼以杜將來惡阻門冬涼潤不特化茱萸之辛熱并以解氤氳之穢毒此皆人所未知生薑醇酒以鼓舞諸藥之性耳然胎氣傷在一月之內為知不為經病而漫用安胎之劑耶必因有所觸而卒有所下故宜急安以保貞固設本婦素稟血熱則茱萸又難藥用胎息本嫌下墮其門冬惡可漫施先輩立法不過舉其大義安能一一盡合人之資稟感觸變態乎然能彙通以後逐月治例應亦無出其右也

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此方 細辛一兩 防風 乾地黄 白朮各二 生薑四兩 吳茱萸大麥各五 烏梅一升 右八味咬咀以水七升煮取二升半分三服先食服多寒者倍細辛茱萸熟多

渴者去之加天花粉二兩若有所思去大麥加柏子仁三合 一方有人參一兩

行義 補胎者補胎氣之滲漏非補胎氣之不足也胎始一月雖未見其不安然前曾傷在一月當力

為之預防逆推所墜之由若子藏不淨何能受孕今既能孕諒非中有宿病也惟本婦稟體過豐濕痰侵犯子藏稟體過瘠血熱不能滋養而致不安者有之此皆人所易明不必宣道其義惟是憂胎之經不因風氣內干而致滲漏卒有所下未必無之所以方中用細辛茱萸防風開發養胎經中風氣白朮

大麥培厚中土以填補津漏之區使以生薑不使津液內竭是為第一收風濕精不隨風而散
驚胎息受陰自可安如磐石也况風藥性竄無竅不入即有風熱氣滯力能迅掃無餘於時胎息尚未
長大不慮其鼓之上逆也試觀五月以後治例自可默識矣

妊娠二月名始膏無食辛燥居處必靜男子勿勞百節皆痛是為胎始結 妊娠二月足少陽脉養不可

針灸其經如胆實即結付陽結骨外立陽穴泉等穴是也足少陽內屬於胆主精二月之時克精成於胞裏當慎謹驚動也 妊

娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下

乍寒乍熱宜服艾葉湯

艾葉湯方 艾葉 丹參 當歸 麻黃各二兩 人參 阿膠各三兩 甘草 四分 生薑 六兩 大棗 十二枚 右九

味咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服 一方用烏母雞一隻宿肥者治如食

法割頭取血內三升酒中相和次以水一斗二升先煮取汁去雞內藥煎取三升內血酒并膠煎取三

升分溫三服

衍義 妊娠足少陽養胎時有所傷犯而卒有所下且乍寒乍熱有似乎中風寒狀以證見心滿臍下

懸急腰背強痛不得不以安胎為務遂於膠艾麥歸劑中參入麻黃一味縱非風寒致病亦可藉以開

發肌腠使內蘊之熱不致侵損胎息雖其例下有中風寒三字實非為風寒設也麻黃在青龍續命方

中洵為發汗重劑在此方與後菊萸湯中不過借以宣散蘊熱之使味耳

黃連湯 有曾傷二月胎者當預服此方 川連 人參各一兩 吳茱萸 五合 生薑 三兩 生地五兩 用阿膠一方

若五味咬咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅一升加烏梅

者不用酢漿直用水耳 一方用當歸半兩

衍義 妊娠惡阻皆由胎息內吸母氣母之胃弱不能敷布水精而為嘔逆以懷孕兩月正當少陽養

胎之時少陽為陰陽交界之限裏寒欲出膈熱阻拒所以嘔惡因前曾傷兩月之胎恐其復臨前報計

維左金丸中萊菔以溫下脘之寒川連以化膈上之熱胃氣不足人參助之子氣不安地黃護之更取生薑辛散開路痰涎酢漿酸收不令上涌倘服後覺不安必是本婦榮氣不勝固閉即當改用烏梅魚開胃氣一舉而兩得之矣然地黃滯膈嘔家所禁而此用之無礙且得留連諸藥其建止逆之功為治妊娠惡阻頂門之針而方下所主纖毫不露洵夫靈機之不可輕泄如此

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好款視璧

玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也 妊娠三月手心主脈養不可針灸其經如中衝帶宮大

門曲澤等穴是也 手心主內屬於心無悲哀思慮驚動 妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤則黃

卒驚恐憂愁嗔怒喜顫仆動於經脈腹滿繞臍苦痛或腰背痛卒有所下宜服雄雞湯

雄雞湯方 雄雞一隻治 黃芩 白朮 生薑各一 麥冬 五合 白芍 四兩 大棗十二 甘草 人參 茯苓

阿膠各二 右十一味咬咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥煮取半內清酒三升并膠煎取三

升分三服一日令盡當溫臥 一方無黃芩生薑用當歸川芎各二兩

衍義 懷身三月當手心主脈養胎於時將有定形欲其成男即於前烏雞方改用雄者其間除去

萊菔之辛熱易入黃芩之苦寒使包絡之火不致內擾而胎息安矣用棗者所以助薑發諸藥性也

茯苓湯 若曾傷三月胎者當預服此方 茯苓 丹參 龍骨各一 阿膠 當歸 甘草 人參各二

大棗各二 赤小豆二十 右九味咬咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日後服一劑腰痛

者加桑寄生二兩深師有雞白二 兩麻子仁一升

衍義 此湯治曾傷三月之胎故於調補氣血藥中用龍骨入肝以斂其固脫赤小豆歸心以承制其

火可無消燦胎氣之虞矣

妊娠四月始受水精以成血脈食宜稻稷羹宜魚雁是謂盛血氣以通耳目而行經絡 妊娠四月手少

陽脈養不可針灸其經如關衝謁池內關三陽手少陽內輸三焦四月之時克六府順成當靜形體和心

志節飲食 妊娠四月有寒心不渴欲飲水腹脹滿不食者其心使動數數吐沫狀如魚肝者

頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服菊花湯

菊花湯方 菊花一升 麥冬一升 大棗十二枚 人參一兩 甘草二兩 當歸各二兩 麻黃二兩 阿膠二兩 半夏四兩

生薑五兩 右十味咬咀以水八升煮減半內清酒三升并膠煎取三升分二服溫卧當汗以粉粉之

護風寒四五日 一方用烏雞雞一隻煮水煎服

行義 胎息四月始受水精以成血脈養胎屬手少陽火氣用事最易損墜若寒鬱火邪惡阻彌甚熱

蒸子藏漫數異常然胎已成形未必便下必卒受風寒或有所驚動勢難叵測不得不於安胎劑中兼

麻黃一味以開泄之雖與前艾葉湯並用麻黃其間輕重迴殊餘味大都相類彼以胎未具體固宜艾

葉丹參之溫以助之此以相火養胎又需麥冬菊花之清以潤之其用半夏者專滌胞門垢膩無慮辛

散傷胎也倘服後汗大出以粉粉之立法雖爾設本婦力難勝任但當師事其法奚必株守其方予嘗

以紫蘇代麻黃既可散邪又可安胎未嘗不信手合轍也

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此方 白芍 生薑各四兩 厚朴 枳實 生李根白皮 白朮 柴

胡略二續斷 川芎 甘草各一當歸半 烏梅一升 右十二味咬咀以水一斗煮取三升分四服

日三夜一八日後復服一劑

行義 調中者調土中之最阜坎陷也土為萬物之母一息不調便生疾苦况曾傷四月之孕至此能

無坎陷乎固之之法阜則削之陷則培之方中枳實厚朴削平塚阜之劑也白朮甘草運平坎陷之劑

也芍歸芍續疎通泉脈之劑也柴胡李根一升清陽一降逆氣生薑烏梅一宣上壅一固下脫務令中

州之氣無過不及以平為期則胎息之運動綽有餘地孰謂立方之名無深意存焉

妊娠五月始受火精以成其氣臥息憂起沐浴浣人深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥

其羹牛羊和以菜羹調以五味是謂養氣以定五臟 妊娠五月足太陰脈養不可針灸其經

如應白大

冲三陰交而各陰足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大鐵無其飽無食乾燥無自炙熱無太

倦後泉等穴是也妊娠五月多熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹

痛問煩欲仆卒有所下宜服阿膠湯

阿膠湯方 阿膠四兩人參一兩生薑六兩當歸 白芍 甘草 黃芩各二兩旋覆花二合吳茱萸七合

麥冬一升 右十味以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三夜一

先食服使愈不瘥再服 一方用烏母雞一隻割取咽血內酒中以水煮雞以前藥減半內酒并膠煎

取三升半分四服

衍義 妊娠五月雖屬足太陰養胎然胎息始受火精而能運動務宜養氣以定五臟設有觸動而卒

有所下則宜大固氣血以安之方中諸藥皆平調氣血之劑惟旋覆一味不可不講本經治結氣別錄

消胸上痰結甄權開胃止嘔逆仲景治心下痞堅噫氣不除同慈曰新絳治婦人半產漏下合諸治推

之則覆花之用可瞭然矣大抵婦人經漏胎息之病元氣雖虛未有不挾風氣痰濕瘀積者觀柏子仁

圓五石澤蘭丸等方自明

安中丸 有曾傷五月胎者當預服此方 黃芩一兩當歸 川芎 乾地黄 人參各二兩甘草 芍藥

各三兩生薑六兩麥冬一升五味子 大麻仁各五枚大棗三十枚 右十二味以水七升清酒五升煮

取三升半分四服日三夜一七日復服一劑

衍義 前調中湯預調曾傷四月之胎比安中湯預安曾傷五月之胎夫調之與安大費斟酌調則有

平治之權安則無剋削之理彼以脾有蘊積故宜枳實厚朴以清之此以素虧津液又須生脈四物以

濡之用麻仁者必妊娠素有脾約之故然麻仁在此方與麻仁丸中不同設非脾約似可勿用若中有

宿滯雖當五月調中何妨倘素稟虧弱縱在四月安中竟與勿疑規矩不出方圓之外也

妊娠六月始受金精以成其筋骨欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜驚鳥猛獸之肉

是為髮脈理細筋以養其力以堅背脊

妊娠六月足陽明脈養不可針灸其經如屬兌豐隆陰市上足

陽明內屬於胃主口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱

往來腹內脈滿身體腫驚怖忽有所下腹中如欲產手足煩疼宜服麥冬湯

麥門冬湯方 麥冬一升人參 甘草 黃芩各二兩 乾地黄三兩 阿膠四兩

生薑六兩 大棗十五 右八

味以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服中閒進糜粥 一方用烏母雞一隻煮水以

煎藥

〔衍義〕六月足陽明養胎時兒受金精以成筋骨卒有所動不安而寒熱往來故宜人參以止驚怖麥

冬以續胃脈地黃以養陰血阿膠以安胎息甘草以除腹痛黃芩以清溫熱生薑以消脹滿大棗以和

寒熱煮用清酒取以行諸藥力也 一方用烏母雞與胎胚無異可見安胎之用不必固守成則耳

柴胡湯 治曾傷六月胎者當預服此方 柴胡四兩 茯苓一兩 白朮 白芍一作甘草 麥冬 川芎

各二兩 生薑六兩 乾地黄五兩 大棗三十 右十味以水一斗煮取三升分四服日三夜一中閒

進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑 前胎傷在六月法當預培胃氣而反不用麥冬必是

妊娠大便艱燥更衣時微有寒熱故用茯苓柴胡佐麥冬地黃以滋血氣不費勞瘁胎自安矣設本婦

大便不實則退茯苓而進麥冬可預擬也

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食穠粳

以密腠理是謂養骨而堅齒 妊娠七月手太陰脈養不可針灸其經如少商魚際列缺尺 手太陰內屬

於肺主皮毛七月之時兒皮毛以成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲 妊娠七月忽驚恐搖動腹

痛卒有所下手足厥冷脈若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強宜服葱白湯

葱白湯方 葱白長三四寸 半夏 麥冬各一兩 旋覆花二合 黃芩一兩 人參半兩 甘草 當歸 黃耆各

兩 阿膠四兩 生薑八兩 右十一味以水八升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日

三服

三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃一兩煮服如前法若秋後勿強清汗
咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥

衍義

金匱三物旋覆花湯治婦人半產漏下旋覆代赭石湯治胸中痰飲痞逆噎氣不除小柴胡湯

治寒熱痞滿或嘔或欬千金合三法而治妊娠七月手太陰肺氣養胎時忽驚恐搖動致子之木精不能內固而卒有所下推其証一一盡顯痰氣逆滿但以証若傷寒因取葱白之散邪安胎為一方之主乃於旋覆花湯中去新絳而用其二旋覆代赭湯中去赭石小柴胡湯中去柴胡各用其五兼合保元當歸補血復參阿膠門冬藥止一十一味而祛風治痰清上補下養血安胎之法畢具無遺方後復有割黃母雞血內酒中則黃雞宜婦人之說其來尚矣

杏仁湯

若曾傷七月胎者當預服此方 杏仁 甘草 紫苑 一兩 鍾乳 乾薑 各三 麥冬 吳茱萸 各一 粳米 五合 五味子 三合 右九味咬咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七日服一劑 一方用白雞一隻煮汁煎藥

日服一劑

衍義

七月胎氣養胎時也前胎傷在七月必是肺逆咳嗽之故故立方專以溫肺為主方中鍾乳乾

薑 萊菔 溫肺之專藥

肺虛有熱又當推門冬紫苑粳米以清肺為急需杏仁五味一散一收甘草和

諸性味使無拒格之虞雖同具一方而主客遂從攸分不可拘以分兩守株而待其免也

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色 妊娠八月手陽明脈養

不可針灸其經

如膏肓二間合谷上下廉三里曲池肩井肩髃等穴是也手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥

物無輒失食無忌大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍

下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒懷腰背苦冷而痛目眈眈宜服芍藥湯

芍藥湯方 芍藥 生薑 各四 厚朴 二兩 甘草 當歸 白朮 人參 各三 薤白 升一

水五升清酒四升合煮取三升分三服日再夜一 一方用烏雞雞黃十枚煎

右八味咬咀以

衍義 胎受土精土成膚草時值母之手陽明養胎陽明外屬脾胃內應子藏今因風寒所觸而流精下寒則子氣之安危係乎反掌亟取專走陽明之薤白一味以開泄經氣即用善護子氣之芍藥助以參朮當歸生薑甘草外佐薤白內助芍藥一服而轉危就安且無風藥動搖胎息之患世醫咸謂愚曰安胎不知薤白之功更勝用厚朴者以其時時小便有所下借內經潔淨府之一法也

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服此方 葵子二升 甘草 厚朴各二兩 白朮 柴胡各三兩 白芍 四兩 生薑六兩 大棗二十枚 右八味咬咀以水九升煮取三升分三服日三凡十日一劑 一方用烏母雞一隻煮汁以煎藥

衍義 此湯預防曾傷八月之胎而方中陰白朮白芍外餘無可安之味也嘗讀文帝本經言葵子主治五臟六腑寒熱羸瘦五種利小便久服堅骨長肌肉而此合柴胡甘草薑棗和榮諸藥必妊娠乍寒乍熱動不安常方與本經葵子之治相符世人以為葵子滑胎孰知有安胎妙用乎今胎在八月兒之胎臟已具產期漸週雖滑無妨而堅骨長肌肉之功未必非胎息默受其益厚朴之用焉知不因小便之有所下歟設本婦無寒熱而用此方無所下而用厚朴確遭八月預安之法其驗與否吾不得而擬議也

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脈養不可針灸其經如湯泉然谷太谿交信足少陰內屬於腎腎主續接九月之時兒脈續接皆成無處濕冷無著炙衣 妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣

宜服半夏湯 半夏 三兩 麥冬 桑葉 黃芩 當歸 阿膠 略二 乾薑 一兩 大棗 十二枚 右七味咬咀以水九升

煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫服四服病即止 一方用烏母雞一隻煮汁煎藥

衍義 經云人有重身九月而瘡胎之絡脈絕也當十月復此言妊娠足少陰養胎兒受石精以成皮

毛石者腎藏之脈與子氣相通則子之藏氣亦實矣今以孕母卒得下痢腹滿急欲用半夏以辟腸
垢蠶更以散腹滿歸膠以護榮血冬寒以行津液此皆恆用之品其理易明獨是白蜜與甘草古未講
蓋蜜能通腸而利反用之必四服痢止腸垢去而正氣復胎自安矣然必臨月始為合劑不可尋常效
用也內經言九月而瘕此言九月下痢各舉一端為例豈妊娠九月非瘕必痢乎

豬腎方 若曾傷九月胎者當預服此方 豬腎一具 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黃 川芎 白

術四附子一升大豆二合 右十味咬咀以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分

四服日三夜一十一劑

行義 孕至九月可無損傷之虞矣以前曾有所墜必是腎氣虛寒不能司成寶之令故用豬腎引領

術附大溫腎氣然須十日更與一劑不可多服恐熱遺子藏反嬰胎毒耳

妊娠十月五臟得備六腑齊通納天地氣於丹田故使闕即人神皆備俟時而生 妊娠一月始胚二月

始膏三月始胎四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月藏胎具九月穀氣入胃十月諸神

備日滿即產矣宜服滑胎藥八月即服

丹參膏 養胎臨月服令滑而易產方 丹參 半升 川芎 當歸 蜀椒 右四味咬

咀以清酒投蒸停一宿以成煎膏膏四升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日服如棗許內酒

中服之不可逆服至臨月乃可服盡用常驗

行義 丹參破宿生新統歸佛手為滑胎易產之專藥而方中便具活法寒用川椒熱用麻仁各隨

母氣之偏勝耳服後諸膏醇酒取其滑澤滋益也苟孕婦中氣不實不特諸膏宜遠麻仁亦難輕試然

觀熱易麻仁一語活法盡情吐露矣

甘草散 令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺方 甘草

一兩 黃芩 一方用 乾薑 桑寄生 大黃 黃卷 麻子仁 桂心 大麥 芍藥 枳實 枳殼 右八味治下

歸酒服方寸七日三暖水服亦得

行義 保生易產而用麻仁黃卷麥芽取其安中利竅能使產時墮地不覺桂心乾薑麥芽取其溫中散血能使產後腹無留滯甘草黃卷一和寒熱一化辛熱也前方以川椒麻仁更迭而適寒熱此以乾薑桂心黃卷麻仁互配而調寒熱機用之靈活如此

千金固 主養胎治產難顛倒胞不出服一丸傷毀不下產餘病汗不出煩滿不止氣逆滿以酒服一丸

一名保生丸 甘草 貝母 秦椒 大黃黃卷 乾薑 桂心 黃芩 糯米一作石斛 石膏各六兩

歸十一麻子三合 右十二味為末蜜和丸如彈子大每服一丸日三用棗湯下 一方用蒲黃一兩

行義 此即前甘草散之變法甘草散方中用桂薑芩甘麻豆等味為滑胎而設此治產難胞衣不下亦不出此但加石斛石膏貝母梗米以清胃之上逆秦椒以下惡氣與萊菔同為止逆下氣之味但彼

用散以利運動之機此用丸以祛毀傷之帶取甘草散之變法而為產難之變治也

蒸大黃丸 治妊娠養胎令易產方 大黃三十兩 枳實 川芎 白米 杏仁各十兩 白芍 乾薑 厚朴

二兩 吳茱萸一兩 右九味為末蜜和丸如梧子大空腹酒下二九日三不知稍加之

行義 養胎而用小承氣用法奇矣小承氣而兼溫養血氣之味變化尤奇大黃得薑木則熱可宣通薑黃得枳厚則平能開泄加以芍芎和榮杏仁利氣不特產時兒無阻逆之患并杜產後母無瘀積之

虞然惟質實氣固者宜之若資稟京薄及虛陽上感之婦諒不處是方也

滑胎令易產方 阿膠八兩滑石 三兩 車前子 一升 右三味治下篩飲服方寸七日再至生月乃服

藥利九竅不可先服

行義 此臨產通用之方阿膠益氣滋血滑石益精利竅車前除濕利水非若上四方之各隨資稟氣

血毫釐不可假借也可見先哲常變之幻神應無窮

妊娠諸病第四 方八十九首

子 卷二

第一 胎動及數墮胎方一首 灸法一首

治妊娠二三月上至八九月胎動不安腰痛已有所有見方 艾葉 阿膠 川芎 枳殼 當歸 芍 甘草 二

兩 右五味以水八升煮取三升去滓內膠令消分三服日三

治妊娠胎動去血腰痛方 阿膠 二兩 川芎 當歸 青竹茹 各五 右四味以水一斗半煮銀二斤

取六升去銀內藥煎取二升半內膠令烱分三服不瘥仍作 一方用甘草三兩

葱白湯 治妊娠胎動不安腰痛方 葱白 物一 阿膠 二兩 當歸 續斷 川芎 各三

水一斗先煮銀六兩取七升去銀內藥煎取二升半下膠令烱分三服不瘥重作 右五味以水一斗半煮銀二斤

治妊娠胎動晝夜叫呼口禁瘕瘕及下重痢不愈方 艾葉一升以水一斗半煮取四升厚更煎取

一升服口閉者格口灌之藥下即瘥亦治妊娠腰痛及妊娠熱病并妊娠下血

行義 膠艾而合芎藭為治胎動不安藥通和妊娠下焦血氣虛寒而腰痛者因為合劑若妊娠虛煩下

血而腰痛者又須退艾葉而用竹茹并用白朮煎水煮服以鎮固脾胃之氣胎自寧矣若妊娠胎動

不安而虛陽上浮或時頭痛或時腹痛亦當去艾葉加葱白佐川芎以散上逆之頭痛加川斷佐當歸

以安下虛之腹痛二方俱不用甘草者嫌其甘緩無清上之速應也若妊娠下痢為下虛不禁又當專

任茶葉以溫榮血煮用好酒以助其力即妊娠病熱腰痛下血亦不出乎溫散之法也

旋覆花湯 治妊娠六七月胎不安常服之方 旋覆花 一兩 半夏 白芍 生薑 各二 枳實 厚朴

白朮 黃芩 茯苓 各三 右九味以水一斗煮取二升半分五服日三夜二先食服

行義 此方專主妊娠氣滯多疾六七月來胎息漸長墮過中氣故用旋覆開發痰氣於上即用枳朮

健運脾氣於中芩黃蓮朴疎利滯氣於下黃芩白芍專護胎氣也若妊娠體瘦血熱中無痰濕阻礙胎

氣即與此方無預也 治妊娠數墮胎方 取赤小豆為末酒服方寸匕日二亦治妊娠數月水尚來者

（衍義）數值必因火或火能消物故取小豆之色赤通乎心包而導血熱為散酒服者此其中有留滯也然在三四月前有之若逾四月即是傷胎不可以大藥論也

又方 妊娠三月灸膝下一寸七壯

第二 漏胞 方四首

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方 生地黃半斤咬咀以清酒三升煮三沸絞去滓服之無時能

多服佳 此大加黃難雜一類治如食法服此散難血和藥中服之

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方 乾地黃搗末以三指撮許酒服三服可瘥○又方 生地黃

汁一升清酒四合煮三四沸頓服不止頓服○又方 乾薑二兩 乾地黃四兩 二味治下篩酒服方

寸七日三

（衍義）漏胎而用地黃必酒煮絞服方無瘀積之患若妊娠氣血本虛助以難血尤為得力若脾氣素

弱不勝陰藥潤下者為散酒服以緩圖之若中氣虛寒難於克運者須配乾薑以鼓地黃之性則安胎

止血兩得其宜矣

第三 子煩 方三首

竹瀝湯 治妊娠常若煩悶此是子煩 竹瀝一升 麥冬 防風 黃芩 各三兩 茯苓 四兩 右五味以水

四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥再作○又方 時時服竹瀝隨多少取瘥止

（衍義）煩屬偏上虛火故用竹瀝瀉肺化熱防風佐黃芩使從表分解茯苓佐麥冬使從下滲瀉總以

不出竹瀝打茹等法如脾氣充實之人不妨時時服竹瀝亦能取瘥更與四卷虛煩諸方參看始詳

第四 心腹腰痛及脹滿 方二十首

治妊娠心痛方 青竹皮一升以酒二升煮三兩沸頓服之○又方 破生雞子一枚酒和服之○又方

白蔘三兩 羊脂八兩 青竹茹一升 右三味合煎食則頓服如棗核大三枚日三○又方 蜜一升

和并底泥塗心下 又方 燒棗二十七枚為末童便服立愈

治妊娠腹中痛方 生地黃三斤搗絞取汁用清酒一升合煎減半頓服 又方 燒車轄脂內酒中服

亦治妊娠咳嗽并產難三日不出 又方 取蜜一升頓服良

〔衍義〕 懷孕而患胃脘急痛獨用竹茹酒煮服之取化無形之蘊熱也若因血熱而痛又宜生雞子和酒服之若因肺胃燥熱而痛則用白蜜羊脂與竹茹合服或單取熟蜜服之并以蜜和并泥塗心下總取保護胎氣也若因胃虛有熱留滯燒棗童便服之若因血熱不能養胎而腹痛者生地搗絞和酒服之與痛胎下血無異妊娠腹中痛燒車轄脂內酒中服之專主卒心腹及咳嗽難產不能出此專取骨澤劑治之用也

治妊娠腹中滿痛又心不得飲食方 黃芩 三兩 白芍 四兩 白朮 六兩

右三味吹咀以水六升煮取三

升分三服半日合藥盡微下水令易生月飲一劑為善

治妊娠忽苦心腹痛方 燒鹽令赤熟三指撮許酒服之立瘥

治妊娠傷胎結血心腹痛方 取小兒尿二升頓服立瘥大良

〔衍義〕 黃芩白朮為安胎專藥以黃芩清熱白朮固土土厚自能載物此惟胎熱不安而上升過動者

宜之若腹滿又心人為營氣不能榮養而胎動不安又常芍藥之酸寒以斂固之使小便微利則機關順利而生產亦易此皆治胎熱之用也其心腹忽痛用燒鹽取鹹以潤下也傷胎血結用小便取寒以導血也是皆因熱而上逆之治設母氣本虛不能榮養胎氣而下墜腹痛又當峻用參朮兼溫補而升舉之非黃芩白朮燒鹽小便等可得而干預也

治妊娠中惡心腹痛方 新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦治妊娠卒胎動不安或但

腰痛或胎轉捨心或下血不止 又方 以水三升洗夫靴剔汁溫服

治妊娠中惡心腹痛方 燒敗鼓皮酒服方寸匕須臾自呼盡主姓名

治妊婦腹痛方 大豆二升以酒三升煮取二升頓服之亦治常人卒腰痛者○又方 麻子三升以水

五升煮取汁三升分五服亦治心痛○又方 香豉二兩榆白皮三兩 右二味熟搗密丸如梧子大

服二十丸亦治心痛○又方 燒牛屎焦末水服方寸匕日三服○又方 地黃汁八合酒五合合煎服

治妊婦脹滿方 取秤鏈燒之淬酒中服良亦治妊婦卒下血

〔衍義〕 新生雞子肘後主妊婦心痛藏器治胎痛下血取其能解一切諸毒也敗鼓皮治一切蠱毒梅

師治中毒下血如驚肝心腹切痛如咬取其能散瘰癧毒也黑大豆淋酒頓服善解婦人風毒下血腰痛

勢甚者宜之香豉榆皮丸服淹久者用之麻子汁治妊婦心痛腰痛服降氣分之火也地黃汁治妊婦

腰痛服降血分之火也燒秤鏈淬酒取辟惡氣散惡血也各審其宜而用之

第五 傷寒方一十六首

治妊婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼方 石膏^{八兩} 大青^{各三兩} 葱白^{切一前胡} 知母^{三兩} 梔子仁^略

右七味吹咀以水七升煮取二升半去滓分五服相去如人行七八里久再服

治妊婦頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方 知母^{四兩} 粳米^{五兩} 生蘆根^{一升} 青竹^{如三兩} 右四味以水

五升煮取二升半緩緩飲之盡更作瘥止

治妊婦傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身 麻黃^半 竹葉^{切一} 石膏^{三兩} 右三味以水

五升煮取一升去滓冷用拭身體又以故布揔頭額胸心燥則易之患瘧者加恆山豆兩

治妊婦傷寒方 葱白^{十莖} 生薑^{切兩} 右二味以水三升煮取一升半頓服取汗

治妊婦中風寒熱腹中絞痛不可針灸方 鯽魚^{一頭} 燒作灰漬末酒服方寸匕取汗

治妊婦遭時疾令子不落方 取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗方五寸又泔清和塗并佳

○又方 犬尿泥塗腹勿令乾

治妊婦熱病方 葱白^{五兩} 豆豉^{一升} 右二味以水六升煮取二升分三服取汗○又方 葱白一把

以水三升煮令熟服之取汗食葱令盡亦主安胎若胎已死者須臾即出○又方 車轄脂酒服大良
○又方 井底泥泥心下三寸立愈○又方 青羊屎塗腹上○又方 水服伏龍肝一雞子大
治大熱煩悶者方 葛根汁二升分三服如人行五里久進一服○又方 燒大棗七枚為末酒和服○

又方 槐實燒灰取方寸匕酒和服

衍義 傷寒之端緒頗繁而妊娠傷寒尤為扼腕豈此十餘例可得而藥治乎當知表裏和解等治與
平人無異但須無礙子氣為之大綱所以千金但舉化熱保胎及單方塗臍等法彙次如左其第一方
以石膏大青麥桅知母疾祛蘊熱從內而解葱白前胡分其土熱之勢從經而散為溫熱時行之方
而熱邪內傷胎氣亦不出此其第二方乃彷彿白虎之製取知母粳米以化胃熱蘆根竹茹專治煩嘔
也若服湯不解則用竹葉石膏湯麻黃煮湯拭體并除煩額胸心取其通達腠理免致熱邪內犯子氣
之患其用意白豆豉用葱白生薑各有微義取豉能解久伏之氣薑能散暴感之邪或但煮蔥服取汗
亦得用葛根者專解陽明經熱也用鯽魚灰者專主脾火上升也用槐實灰者專主大腸燥熱也用車
轄脂者專主腹中緩急也用棗灰者專主胃府蘊熱也二方主妊娠心腹腰痛治例相類但彼治內大
故用尿服此治外熱故用酒服稍通權變耳用伏龍肝者專主子氣不固并取塗臍及犬矢泥青羊屎
井底泥塗並佳虛寒則用伏龍肝犬矢泥虛熱則用青羊屎大熱則用井底泥若心腹大熱絞痛和蜜
塗之各分寒熱輕重為當

第六 瘧疾 方二首

妊娠患瘧方 恆山二兩甘草一兩黃芩三兩烏梅十四石膏八兩 右五味咬咀以酒水各一升半合

漬藥一宿煮三四沸去滓初服六合次服四合後服二合凡三服○又方 恆山 竹葉各三 石膏八

粳米一百粒在佐外憂作糖 右四味咬咀以水六升煮取二升半去滓分三服第一服取未發前一

食頃服之第二服取欲發服之餘一服用以塗額額及胸膈五心藥漬置頭邊當一日勿近水以進

飲食遺發後乃進粥食

衍義 夫應家之畏常山猶傷寒家之畏麻黃也而妊娠之應用之不疑良因寒熱勢甚胎之安危在乎反掌故二方悉首推之而又各取白虎之半一用石膏甘草兼黃芩以護子氣烏梅以收津液一用石膏梗米兼竹葉以清心包總以化熱保胎為務其後方乃留一服以塗頭額胸心與傷寒用麻黃竹葉石膏試體之法不殊夫麻黃恆山之性雖猛然用酢製透原無汗脫胎傷之患倘妊娠素稟虛羸不妨但效其法改用白虎加人參加桂枝加草果加半夏等未嘗不為金匱千金法外之法耳

第七 下血 方十一首

治妊娠忽暴下血數升胎燥不動方 榆白皮 三兩 當歸 生薑 各二兩 乾地黄 四兩 葵子 一升 時後不用 右五味以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服之

衍義 忽暴下血而胎不運動須防墮故用地黃當歸和血之味即兼榆皮葵子利竅之品一以分利滲道使血化之水不致混亂榮血而妄行一以疎利機竅乘勢當下則下底免胎乾阻閣之虞用生薑者專取辛散以通血氣之滯也

馬通湯 治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升方 馬通汁 一升 乾地黄 阿膠各四兩 當歸 艾

葉 各三兩 右五味咬咀以水五升煮取二升半去滓內馬通汁及膠令烊分三服不瘥重作

膠艾湯 治妊娠二三月上至七八月其人頓仆失踞胎動不下傷損腹痛欲死若有所見及胎奔上

搶心短氣方 艾葉 三兩 阿膠 川芎 白芍 甘草 當歸 各二兩 乾地黄 四兩 右七味咬咀以水

五升好酒三升合煮取三升去滓內膠更上火令盡消分三服日三不瘥更作

治妊娠卒下血方 葵子一升以水五升煮取二升分三服瘥止○又方 生地黃切一升以酒五升煮

取三升分三服亦治落身後血○又方 取葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三

衍義 因墮仆卒驚而血驟下故需馬通散血歸地和榮膠艾安胎以急救之若頓仆失踞而胎動不

蟹爪湯

方

蟹爪 一升 甘草

桂心略二
阿膠二兩

右四味吹咀以東流水一斗煮取三升去滓內膠烺盡

能為一服佳不能者食頃再服若口急不能飲者格口灌之繫下便活也與母俱生若胎已死獨母活也若不懷仆平安妊娘無有所見下血服此湯即止或云桂不安胎亦未必爾

衍義

胎傷下血已劇勢難保全急當散血以救其母方用蟹爪桂心溫散積滯阿膠甘草和血安中

遲則難於爲力矣若胎息未損仍得子母雙全設胎氣已傷而不急下并母亦不得而救也蟹性橫行破血故妊娠忌食而傷胎下血子死腹中下胞衣方多用之以其觸之即脫格物致知之道也

治妊娠胎墜下血不止方

丹參十二兩 咀以清酒五升 煮取三升 分三服 溫日三服 又方 地黃汁

和代縮為末服方寸匕。又方桑蠶蟲屎燒灰酒服方寸匕。

香豉湯

治半塵下血不盡苦來去煩滿欲死方 香豉一升半以水三升煮三沸去滓內麝用末一方

寸匕。服之須臾，血自下。鹿角燒，亦得。

行義

丹參一味功同四物更用酒煎以和其性丹方中之良藥也其地黃汁和代豬苓服是因去血

過多而鎮攝之也若半產血脫而煩則用鹿角溫散積血於下香豉清解虛煩於上而腹滿自除無諸破血而瘀自不能留矣

第八

小便病 方十五首 灸法一首

治妊娠小便不利方

葵子一升 榆白皮切一升

右二味以水五升煮五沸每服一升日三服方

子孫令

石二味為末以水服方寸匕日三小便不利者便利則止便不利者

治妊娠患子淋方 葵子一升以水三升煮取二升分再服○又方 葵根一把以水三升煮取二升分再服

治妊娠小便不通利方 蕪菁子七合為末水和服方寸匕日三

衍義 妊娠溺瀦子淋皆膀胱氣化之阻積故用葵子榆皮之滑澤利竅與葵子茯苓之甘寒淡滲及單取葵子葵根其則蕪菁子一味為散以取疏利之專功也

治妊娠尿血方 黍稷燒灰酒服方寸匕日三

治婦人無故尿血方 龍骨五兩治下篩酒服方寸匕空腹服日三久者二十服愈○又方 爪甲亂

髮 右二味並燒末等分酒服方寸匕日三飲服亦得○又方 桂心 鹿角屑 大豆黃卷各一兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三服○又方 取夫爪甲燒作灰酒服之○又方 取故舂上竹茹曝

乾搗末酒服方寸匕日三亦主遺尿

衍義 妊娠尿血必非無故急需散血為主故用黍稷即小米燒灰不特散血兼可安中宜乎妊娠用

之若婦人尿血雖云無故亦必有傷於血故用爪甲髮灰爪為筋之餘髮為血之餘總取散血之用耳

若血脫過多而色稀淡中無阻滯者又須龍骨以斂固之其桂心鹿角溫血散血大豆黃卷本經雖主

筋攣膝痛蓋訖言破婦人惡血羣婦藥中多用之得桂心鹿角共襄散血之功而無傷中之患虛寒者

宜加用之

治婦人遺尿不知出時方 白薇 芍藥各一兩 右二味治下篩酒服方寸匕日三○又方 礬石 牡

蠣各二兩 右二味治下篩酒服方寸匕亦治丈夫○又方 胡燕窠中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

○又方 燒遺尿人薦草灰服之瘥○又方 灸橫骨當陰門七壯

衍義 二方各有功用若脾胃熱移於下而遺尿者用白薇以清膀胱之上源芍藥以收內胞之津氣

若膀胱氣脫不收而遺尿者用礬石牡蠣之酸瀦以斂固之然必火衰於下者宜之倘濕熱癰閉候用

則與戈戟無異也

第九 下痢方八首 灸法一首

治妊娠下痢方 人參 黃芩 酸石榴皮 各二 檉皮 四兩 粳米 三合 五味 呖咀水七升 煮取二升 半分

三服

衍義 脾胃為身之津梁脾氣固則胎氣亦固故妊娠帶下專宜固脾為主雖有積滯止宜苦寒以堅腸胃胃氣有權則積氣自除此方之用檉皮專主斷痢黃芩專護胎熱榴皮專司固脫人參粳米專扶中氣并助上三味之力也

又方 白楊皮一觔 呖咀以水一大升 煮取二小升 分三服

衍義 白楊皮不獨主妊娠下痢兼能利水去風痺宿血水血去而痢自止胎自安矣

又方 燒中衣帶三寸為末服之 又方 羊脂如碁子大十枚 溫酒一升 投中頓服之日三

衍義 諸脂滑利傷脾動瀉獨羊脂性熱止下痢治脫服能治產後腹中絞痛故千金用之本草言其柔金與銅其滌除腸垢之力可知

治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方 薤白 切一 酸石榴皮 黃柏 各三兩 產阿膠 二

地柯 四兩 右五味 呖咀以水七升 煮取二升 半分三服 不瘥更作

衍義 薤白溫中散結專主胸痺結痛南陽治腹痛下重能泄陽明氣滯榴皮酸瀉黃柏苦堅阿膠溫補地榆止血為冷熱之要方以有薤白溫中之功無慮榴榆止澀之患也

治妊娠注下不止方 阿膠 艾葉 酸石榴皮 各二 右三味 以水七升 煮取二升 去滓內膠合烱分

三服

衍義 艾葉溫血阿膠佐之榴皮固脫艾葉輔之允為安胎脫痢之專藥不在藥味之繁多也

治妊娠及產三寒熱下痢方 黃連 一升 黃柏 一升 梔子 炙十 右三味 呖咀以水五升 漬一宿 煮三沸

服一升一日一夜令盡過者如橘皮一兩生薑二兩亦治丈夫常服

行義 苦燥之藥能堅腸胃故用連柏以辟除濕熱梔子以疎通滲道勝於黃芩之但能安胎而無法

通利之用也方後有云嘔加薑橘雖言治嘔而能運行中氣鼓舞藥力縱無嘔逆亦宜用之

治婦人欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方 石榴皮 麴略八 黃柏一作 烏梅肉 川連 艾各

雨防已二兩一作防風 阿膠 乾薑略三 附子五兩 右十味為末蜜丸如梧子大飲服二十九日三漸加至

二十四丸

行義 下痢腹脹滿濁陰內結也非薑附無以散之欲痢輒先心痛濕熱泛溢也非連柏無以折之濁

濕阻滯非防麴無以泄之血液不守非膠艾無以安之津液脫亡非梅榴無以固之然須蜜丸款留藥

質於中非特津液可禦而薑附之性亦不致於驟發底腹中之寒熱和而滯下瘳矣

治婦人水洩痢方 灸氣海百壯三報

第十 水腫方五首

治妊娠腫有水氣心腹急滿方 茯苓 白朮各四兩 黃芩 杏仁各三 旋覆花一兩 右五味吹

咀以水六升取二升半分三服

行義 此方專主肺氣下降而喘脹逆滿故用杏仁旋覆專利膈上之痰氣茯苓白朮專利腹中之水

氣黃芩一味專清胎息之熱氣也

鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣方 鯉魚二頭 白朮 生薑略五 白芍 當歸略三 茯苓四兩 右

六味咬咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升內藥煎取三升分五服

行義 此方專主脾氣不化而水溢胞宮故用鯉魚專行利水茯苓專行燥溫歸芍專行護胎生薑專

行辛散使周身之樞機利而水自除矣

治妊娠毒腫方 蘇青根洗淨 去皮搗碎和如薄泥勿令有汁猛火煮二三沸適性薄腫以帛急裹之日

再易寒時溫覆非根時用子若腫在咽中取汁含嚥之○又方 燒榛牛尿酢和傳之乾則易亦可服
方寸匕日三

衍義 前治小便不通用蕪菁子為散水服此治妊娠周身毒腫用蕪菁根和酢搗數總取下氣消腫
之功也

治妊娠手脚皆腫急方 赤小豆 五升 商陸根 一斤 右二味以水三斗煮取一斗稍稍飲之盡更作

一方加澤漆一斤

衍義 此方專主濁濕暴腫故用商陸峻攻而兼赤豆之清心利水苟涉虛羸未可輕試

產難第五 論一首八條 方二十二首

論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得令死喪污穢家人來視之則生難若已產者則傷
兒也 婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著地則殺人及浣濯衣水皆
以器盛過此忌月乃止 凡生產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母子俱病庶事皆不
稱心若能依圖無所犯觸母即無病子亦易養凡欲產時特忌多人瞻視惟得二三人在傍侍產訖乃可
告語諸人也若人衆看視無不難產 凡產婦第一不得忽忽忙怕傍人極須穩密實不得預緩預急及
憂悵憂悵則難產若腹痛眼中火生此兒迴轉未即生也兒出訖一切人及母皆忌問是男是女兒始落
地與新汲井水五咽忌與煖湯物勿令母看視穢汚 凡產婦慎食熱藥熱麵食常識此飲食當如人肌
溫溫也 凡欲臨產時必先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令至密即易產也 凡產難及子死腹中
并逆生與胞胎不出諸篇方可通檢用之

治產難或半生或胎不下或子死腹中或著脊及坐草數日不產血氣上搶心母面無顏色氣欲絕者方

醇酒 二升 白蜜 成煎諸膏各一

血不除上搶心痛煩急者以地黃汁代醕酒 右三味合煎取二升分再服不能再服可隨所能服之治產後惡

保脾尚恐產後元氣不固之比
方宜水土南北懸殊西北風高土厚民多實剛燥故宜甘溫之藥若東南水土卑弱氣力

治產難方 槐枝^切二 榆白皮^切 大麻仁^升一 瞿麥 通草^各三 牛膝五兩

升煮取三升半分五服○又方 香皂莢子二枚○又方 取廁前已用草二七枚燒灰水調服之○

又方 令夫唾婦口中二七過立出○又方 針兩肩井入一寸當之須臾即分挽

治產難三日不出方 取鼠頭燒作屑并花水服方寸匕日三○又方 車軸脂各大豆許兩丸○又方

燒藥杵令赤內酒中飲之○又方 燒大刀鏤以酒一杯沃之頓服即出救死不分婉者

治產難累日氣力乏盡不得生此是宿有病者方 阿膠二兩 赤小豆二升 右二味以水九升煮豆令

熟去滓內膠令烊每服五合不覺更服不過三服即出○又方 槐子^{十四} 黃^{一合} 右二味合內

酒中溫服須臾不生再服之水服亦得○又方 生薑汁 生地汁^{各半} 右二味合煎熟頓服之

治產難及日月未足欲產者方 知母一兩為末蜜丸如兔屎大每服一丸痛不止更服一丸

羚羊角散 治產後心悶是血氣上衝心所致者○又方 羚羊角一枚燒作灰治下諸以東流水服方

寸匕若不瘥須臾再服取悶瘥乃止○又方 殺羊角燒作灰以溫酒服方寸匕不瘥須臾再進方以

治產難

治產乳運絕方

半夏一兩搗篩丸如大豆內鼻孔中即愈^{此扁鵲也}○又方

難產○又方 赤小豆搗為散以東流水服方寸匕不瘥更服○又方 含醢醋嚙面即愈凡悶即嚙

之○又方 取醢醋和產血如棗大服之

治心悶方

產後心悶眼不得開即當頂上取髮如兩指大強以人牽之眼即開

衍義

產難用滑澤利竅之藥為之通例若平昔脾氣不固者則牛膝麻仁亦宜斟酌若氣弱之婦愈

用滑利則胎氣愈陷產門愈阻非峻用人參固氣不能助之使下孰謂催生之法一言可蔽哉如產難

用燒鼠頭者取其屬腎而性善竅也用車軸脂者取其滑利而善轉運也用刀鐐酒者取其剛決而能鎮攝諸邪也用阿膠赤小豆者取其滋血而蕪利水達竅也用槐子蒲黃者取其散血而清子藏之熱也用地薑汁者取其滋血而通經脈之滯也用知母者取其滋陰專清子戶之火也用羚羊角燒灰酒服者取其舒筋而開竅散血也用羖羊角燒灰酒服者取其散血通治產後餘疾也用神麴末者取其健運而散留積之滯也用赤小豆者取其利水而能清熱散血也用半夏擔鼻者取其善嚏而能開發諸竅也用醋醋嚏面者取其辟惡而能收攝神氣也牽項明髮者令其上引不使隨氣下脫也

衍義

難產藥多不應不獲已而廣蟬丹方及外助諸法以祈僥倖庶便隨宜採擇以濟急需觀後橫

生子死胞衣不出等例與此互參自明

子死腹中第六論一首方十七首

論曰凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母唇口青口兩邊沫出者母子俱死母面青舌赤口中沫出者母死子活

治動胎及產難子死腹中并妊娠兩兒一死一生服之今死者出生胎安神驗方 蟹爪一升甘草二尺阿膠

三兩

右三味以東流水一斗先煮蟹爪甘草得三升去滓次內膠令烊頓服之不能分再服若人因

拘口內藥藥入即活煎藥作東向竈用葉新煮之

真珠湯 治胎死腹中方 熟真珠一兩榆白皮切一

治子死腹中不出方 牛矢塗母腹上立出○又方 取竈心黃土三指撮以酒服之立出土當著兒頭

上亦治逆生及橫生不出手足先見者○又方 取夫尿二升煮令沸飲之○又方酢二升拗口開灌

之○又方 吞槐子二七枚亦治逆生○又方 三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合

煮令產婦東向飲之立出○又方 瞿麥一斤以水八升煮取二升一服一升不出再服

治妊娠未足月而胎卒死不出其母欲死方 以苦酒濃煮大豆每服一升死胎立出不能損母

一方用醪酒煮大豆亦治積聚成瘕 治妊娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背痛方 甘草一尺 筒桂四寸 雞子一枚 蒲黃二合 香豉二升 右五味以水六升頓服之胎胞穢惡盡去大良

衍義 難產取效甚難而下死胎胞衣尤為最難惟蟹爪湯一方素推催生第一得效後世免腦丸能下生胎不能下死胎以其無氣運動全賴穩嫗之用力得宜也此即前下血方中蟹爪湯於中除去桂心加用甘草阿膠也夫桂心溫散之品子死腹中正宜加用而反去之必本婦去血過多恐復走血而不便用非此證之不當用桂也觀此例後方有用甘草筒桂雞子蒲黃香豉者與此頗同但此用阿膠專補榮血甘草專培胃氣彼以蒲桂專行血滯香豉專主虛煩而方下不言以俟用方者之自悟耳用葵子阿膠者因產婦本弱不勝破血俱與和榮利竅也用真珠榆皮者取其鹹寒降泄能下死胎胞衣也用醋煮大豆酒煮大豆者總取黑豆之主傷中淋露也其酒之與醋則有行止之分勿以尋常食品而忽諸用瞿麥煮服者本經所謂墮子下血閉也用槐子吞之者甄權專治土熱難產也用竈土酒服者別錄首治婦人崩中取其溫散積垢也用夫尿飲之者取其能降惡血同氣相投如磁引鐵也用牛屎塗腹者產寶專主子死腹中取其穢惡以絳穢惡之帶血也

治妊娠得病須去胎方 以雞子一枚鹽三指撮和服立下 此與沉同南產難產相同 又方 麥芽一升為末蜜和一升服之立下○又方 七月七日神麴二升酢一升煮兩沸宿不食平旦頓服之即下○又方 大麥麴五升酒一斗煮三沸去滓分五服令盡當宿勿食其子如糜令母肥盛無疾苦

衍義 母氣子氣兩相為命此以母病去胎是必勢難兩保姑取混沌未分之氣加以鹹潤輔之猶木之將萎略得微風絲雨其寔即墮也若胎氣有力雖毒藥屢攻尚且牢不可動况雞卵食鹽尋常食品可下乎其用麥芽用神麴用麥麴用蜜調用酢煮用酒煎雖緩急輕重不侔而伐胃耗氣則一其酒煎

麥麴不特下胎并能絕孕然必母氣素充故能勝任而服之反能肥盛無疾稍涉虛羸恐難輕試

逆生第七 論一首 方十四首

論曰凡產難或兒橫生側生或手足先出可以針鉗刺兒手足入一二分許兒得痛驚轉即縮自當逆順也

治逆生方 以鹽塗兒足底又可急瓜撥之并以鹽摩產婦腹上即愈○又方 以鹽和粉塗兒足下即

順子母秘錄云以鹽和胡粉○又方 取梁上塵如彈丸許二枚沿末三指撮溫酒服之

治逆生及橫生不出手足先見者方 燒蛇蛻皮為末服一刀圭三枚云面向東酒服即順○又方 取蟬

蛻二枚治為末三指撮許溫酒服之龍氏外臺子母秘錄作彈丸二枚為末酒服○又方 取夫陰毛二七莖燒以猪膏和

丸如大豆吞之兒手即持凡出神驗○又方 取蛇蛻皮燒灰猪膏和丸向東服○又方 以手中指

取釜底墨灰畫兒足下即便順生○又方 取父名書兒足下即順生

治橫生及足先出者方 取梁上塵竈突墨酒服之○又方 取車轄中脂書兒足下及掌中

治縱橫生不可出者方 兒慈子末酒若米汁服方寸匕即生車前亦好服如上法○又方 以水苦酒

服竈突墨塵

治產時子但過穀道方 熬鹽熨之自止

行義 子不順下皆緣母氣之逆雖有方藥渡難為力所以千金僅取丹方以祈專力如用蛇蛻蟬殼

者取其頑脫之速也用竈突墨梁上塵取其能辟垢穢破積血也用兔然者取其能續傷故千金聖

惠專治橫生其補腎肝利水道與車前不殊也以鹽塗兒足底者欲令縮入轉而順下也以車轄脂書

兒足掌者取其滑澤易於轉下也以鹽包熱熨母穀道者欲令避熱而趨正道也蓋鹽性順下故產逆

恆用之

胞胎不出第八 方二十二首

治重兒胞衣不出令胞爛方 牛膝 瞿麥 各一當歸 通草 各一滑石 各二兩一作葵子 八兩

治產難胞衣不出橫倒者及兒死腹中母氣欲絕方 半夏 白飯各二 右二味治下篩服方寸匕產

難一服橫生二服倒生三服兒死四服亦可加代糖薑麥各二兩為佳

治胎死腹中苦母病欲下之方 取榆白皮細切煮汁三升服之即下難生者亦佳○又方 生地汁一

升苦酒三合令暖服之不能頓服分再服亦得○又方 牛膝 三兩 葵子 一升 右二味以水七升煮

取三升分三服○又方 澤蘭葉 三兩 滑石 五兩 生麻油 二合 右三味以水一升半煮澤蘭取七合

去滓內滑石麻油頓服之

治胞衣不出方 取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出亦治橫逆生者○又方 瓜瓣二七枚服之立出

良○又方 取水煮弓弩弦飲五合即出亦可燒灰酒服○又方 取宅中所理柱掘出取坎底當柱

下土如雞子大酒和服之良○又方 墨三寸為末酒服○又方 取蒲黃如棗許以井花水服○又

方 苦酒服真珠一兩○又方 鷄子一枚苦酒一合和飲之

治逆生胎不出方 竈上墨以酒煮一兩沸取汁飲之

治產後胞不得出方 井底土如鷄子中黃以井花水利服立出

治子死腹中若衣不出欲上搶心方 急取蟻蛭土三升熬令熱囊盛慰心下令胎不得上搶心良○又

方 末竈突中墨三指撮許以水苦酒調服立出當著兒頭生○又方 取夫內衣蓋井上立出○又

方 取炊藏當戶前燒服之

行義 下胞衣較之下死胎愈難為力縱儘力用藥收效良難如牛膝湯為下胞衣之專藥所謂諸味

一皆淡滲利竅之品既服之後闕竅稍開急須乘機速取或令嚼髮取嘔或與搐鼻取嚏以助藥勢轉

危就安在乎一瞬失此機宜闕竅緊閉雖有神丹將何措指其次則用半夏白飯二味以半夏辛潤能

行濕而通大便利竅而泄小便別錄言其墮胎其祛逐穢惡之性可知白飯世諫外科而本經主女子

陰中腫痛帶下赤白則下氣散血之功亦是不凡而肥盛多痰之母尤為合轍加代精瞿麥者用以鎮攝逆氣而利關節也用榆皮用半膝麥子用澤蘭滑石麻油咸取滑澤利竅而各司其用也用瓜瓣者取其能散結聚破膿血不特治腸壅之用也其鷄子苦酒及苦酒真珠二方與前子死腹中同榆白皮用不殊但皮用榆皮以利阻滯之竅此用苦酒以收耗散之神稍為異治耳用小麥小豆者取小豆之利竅小麥主痛血奔令女人易孕也用蒲黃者取其能散血而胞衣亦得易下也用地黃汁者取其能散血室之熱也用井底泥者取其能下腹中之熱也用弓弩弦者取其迅發之疾也用蟻蛭者取其善穴而運動不息故千金藏器皆用以搶心下令胎不上搶心也已上諸治雖皆得驗成方然間有寒滑傷脾難以藥施如井泥麻油之類皆是西北治例故欲用其方須詳方宜水土要在臨病之審辨耳

下乳第九方十一首

鍾乳湯 治婦人乳無汁方 石鍾乳 硝石一用 白石脂各六兩 通草十二兩 桔梗半兩 右五味咬咀以

水五升煮三沸三上三下去滓內硝石令烊分服○又方 石鍾乳 通草各等分 右二味為末粥飲

服方寸匕日三服可食兩乳用乳心者是勿服 一方二味酒五升漬一宿明旦煮沸去滓服一升

日三復令乳氣通服○又方 石鍾乳 甘草二兩 漏蘆三兩 通草 桔梗根各五兩 右五味咬

咀以水一斗煮取三升分三服一云用桔 又方 石鍾乳 通草各一兩 漏蘆半兩 桂心 甘草 桔

梗根各二兩 右六味治下篩酒服方寸匕日三服驗○又方 石鍾乳 漏蘆各二兩 右二味治下篩

飲服方寸匕即下 右四味咬咀米宿漬揩撻取汁三升煮

漏蘆湯 治同前 漏蘆 通草各二兩 石鍾乳 一兩 黍米 一升

藥三沸去滓飲之日三 右四味治下篩先食糖水服方寸匕

通蘆散 治同前 漏蘆 石鍾乳 桔梗根各一兩 蟬蛻 三合

麥門冬散 治同前 麥冬 通草 理石 石鍾乳 石四味各等分治下篩食酒服方寸匕日三

服方寸匕日三 又方 母猪蹄一具麋切以水二斗熬得五六升汁飲之不出更作 又方 猪

蹄二枚熟通草切細 右二味以酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作 外臺猪蹄小炙以水一斗煮

方 栝蒌根切一升酒四升煮三沸去滓分三服 又方 栝蒌根 漏蘆各三石鍾乳四兩白頭翁

一兩滑石 通草各二 右六味治下篩以酒服方寸匕日三 又方 取苦蕒根尚青色大者一枚

熟搗以白酒一斗煮四升去滓溫服一升日三黃色小者用二枚亦好 又方 土瓜根治下篩服半

錢七日三乳如流水

單行鬼箭湯 治同前 鬼箭五兩以水六升煮取四升每服八合日三亦可燒作灰水服方寸匕日三

甘草散 治同前 甘草一兩通草三十 石鍾乳二十 雲母二兩 瓦上散草一匙 右五味治下篩先

食漏蘆湯服方寸匕日三乳下止 又方 燒死鼠作屑酒服方寸匕日三立下勿令知 又方 燒

鯉魚頭為末酒服三指撮

鯉魚湯 下乳汁方 鯉魚一尾長猪肪切并 漏蘆 石鍾乳各八 右四味以清酒一斗二升合煮魚

既藥成絞去滓適寒溫分五服其間相去須臾一飲令藥力相反為佳乳即下

如管能利九竅也而硝石石脂雲母皆鍾乳之佐耳熱則右膏為通乳之專藥以其肌理鬆脆能通肺

胃之熱也而理石滑石亦右膏之亞耳寒熱糾結非鍾乳與理石並用不能使之即通務在隨其偏勝

而調適之斯無不當矣漏蘆通草清熱利竅之專藥栝蒌土瓜根開痰化熱之專藥猪蹄鯉魚滋養氣

血之專藥鯉魚頭燒炭灰利水通津之專藥桂心螭螬白頭翁鬼箭溫血破血之專藥麥冬栝蒌甘草

黍米輔佐之流調和諸藥亦不可缺合諸方諸味而統論之雖有沉寒客熱痰氣血瘀之不同總不越開關利竅一法於此推諸方之用豈特聞一知十而已哉
孫真人備急千金要方卷三

婦人方中凡八類

虛損第十 論一首 二條方

論曰婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病廣於萬倍何則產後之病難治於餘病也婦人產訖五藏虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須藥藥若行藥轉更增虛就中更虛向生路遠所以產後百日以來極須慙懃憂畏勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反搔直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或有微不慎戲笑作病一朝困卧控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱得醫來大命已去何處追尋學者於此一方大須精熟不可同於常方耳特忌土廁便利宜室中盆上佳 凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之 凡婦人皆忌風氣膝下虛冷莫不由此早行房故也 凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例俟三兩日消息可服澤蘭凡比至滿月九盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐須服澤蘭丸補之服法必七日外不得早服也 凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病競起迄至於老百方治不能痊桃仁煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至年內將常服之佳

四順理中圓

產訖可服此方

甘草

人參

白朮

乾薑

各一

右四味為末蜜和丸如梧子大服

十丸稍增至二十丸新生藏虛所以養藏氣也

行義 理中加以四順之街以太陰手足自溫雖有虛寒祇宜理中溫之非少陰四逆之比產後諸虛

桃仁煎 治婦人產後百病諸氣喘急悅澤方 桃仁一斗二升枝擣令細熟以上好酒一斗五升研濾

三四遍如竹麥粥法以極細為佳內長項瓷瓶中密塞以麵封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火

猛使瓶口常出在湯上無令沉沒熟訖出溫酒服一合日再雖丈夫亦可服也

行義 桃仁雖能逐瘀然隨烏藥莢茂則專於破血隨苦歸芍藥則相胥和血若單用一味破之與和

惟在多用少用之間兼之以酒為產後和血聖藥但所稟柔脆坐草無傷無所留滯者不在此例

石斛地黃煎 治婦人虛羸短氣胸逆滿悶風氣方 石斛 甘草 紫苑各四 桃仁半升 桂心二兩 大

黃八兩 麥門冬二升 茯苓一升 生地黃汁 醅酒 右十味為末於銅器中炭火上熬內鹿角膠

一斤耗得一半次內鉛三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生竹攪無令著耗令相得藥

成先食酒服如彈子一九日三不知稍加至二九 一方用人參三兩

行義 虛羸短氣而用地黃門冬舉世之通套用桂心大黃近世所未聞須知地黃門冬得桂心則滋

而不滯桂心得大黃則宣而遂通鹿角膠醅酒飴糖白蜜等溫養精血之味咸得辛溫敷布之力群行補

劑之中雖有一味大黃祇能行滯斷無泄瀉之理譬如刻坐皆端直即有一匪人亦必隨之而向化矣

地黃羊脂煎 治婦人產後欲令肥白飲食平調方 生地黃汁一斗 生薑汁 白蜜各五 羊脂二斤

右四味先煎地黃令得五升次內羊脂合煎減半內薑汁復煎令減合蜜著銅器中煎如飴取雞子大

一枚投熟酒中服日三

行義 地黃純陰滋膩能治傷中淋露羊脂性溫益津能固腸胃虛脫蜂蜜解毒和中能除心腹邪氣

以產母素稟燥熱故取潤劑以滋之薑汁辛散專行三味之膩也

地黃酒 治產後百病未產前一月當預釀之產訖蓐中服之方 地黃汁一升 好麴 好米糲二 右

三味先以地黃汁漬麴令發華家法醱之至熟封七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絕慎蒜生冷

醉滑猪雞魚一切婦人皆須忌之但夏三月熱不可合春秋冬並得合服地黄并滓內米中炊合用之
一石十五一準此一升為率先服羊肉當歸湯三劑乃服之佳

行義 地黄寒滯得鞠藥發之滋養血虛之良法不當以藥例之

羊肉湯 治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛方 肥羊肉三斤去脂當歸九用桂心 甘草各一兩芎藭三兩

母秘錄 芍藥子母秘錄 生薑各四兩乾地黄五兩

餘藥煮取三升去滓分三服不瘥重作白一升

行義 金匱當歸生薑羊肉湯為產後腹中疝痛之聖藥即寒疝小腹結痛亦得用之況合四物以調

其血加桂以通其滯用甘草者以緩薑桂之急也緩急得宜功補兼濟非深入金匱之奧何以及此

猪腎湯 治產後虛羸喘乏乍寒乍熱如癰狀名瘵勞方 猪腎去脂剖香豉綿裹白粳米 葱白各一

右四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥更作廣濟方有人參當歸

行義 產後百脉皆虛虛風易感每致虛羸喘乏寒熱如癰故取葱白香豉湯加猪腎以安其腎粳米

以安其胃并調先後二天即無虛風亦無妨礙金匱旋覆花湯中用葱白未嘗為風而設

羊肉黃耆湯 治產後虛乏補益方 羊肉三斤黃耆三兩大棗三十枚茯苓 甘草 當歸 桂心 麥

門冬 乾地黄 芍藥各二兩 右十味咬咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥煎取二升去滓分

三服日三

行義 前羊肉湯以有腹中絞痛故用薑豉之辛以散之此無腹中絞痛專宜補虛故用黃耆茯苓門

冬大棗滋養營氣可無藉於辛散也

鹿肉湯 治產後虛羸勞損補之方 鹿肉四斤乾地黄 甘草 芎藭 黃耆 芍藥 麥門冬 茯

苓各二兩人參 當歸 生薑各一半夏一升大棗二十枚 右十三味咬咀以水二十五升煮肉取一斗

三升去肉內藥熟取五升去滓分四服日三夜一

損之神丹專於婦人科者急須者服
鹿肉湯合羊肉黃耆湯以鹿易羊更加人參半夏健運中氣鹿肉填補腎腎潤為產後虛羸勞

摩膏湯 治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏府冷熱不調方 摩骨一骨 遠志 黃耆 芍藥 乾薑

防風 茯苓 厚朴 當歸 橘皮 甘草 獨活 芍藥 桂心 生薑 四兩 右十五

味咬咀以水三斗煮摩骨取二斗去骨內藥煎取五升去滓分五服

衍義 產後虛羸秋宜溫養一切苦寒切不可犯方中桂心芍藥專和寒熱不調餘皆健脾和營之品

惟摩骨一味為堅強筋骨克復勞傷之藥惜乎世鮮知用也

當歸芍藥湯 治產後虛損逆害飲食方 當歸 芍藥 人參 桂心 生薑 乾地黄 甘草 各

兩大棗一升 右八味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

衍義 此以內補建中湯除去膠飴易入人參地黃平調血氣雖有虛羸寒熱無不可治豈特逆知飲

食而已哉

杏仁湯 治產後氣虛方 杏仁 橘皮 白前 人參 蘇葉 半夏 桂心 四兩 生薑 兩 麥

門冬二兩 右九味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

衍義 產後浮腫喘乏總屬氣虛風襲之故故效金匱大半夏湯之法參以蘇杏白前疎風利氣之品

又以桂半性燥以門冬濟之與大橘皮湯用蜜不殊蘇杏耗氣以人參固之較大橘皮湯用意稍別

治婦人產後上氣責脈積勞藏氣不足胸中煩躁闕元以下如懷五千錢狀方 厚朴 桂心 當歸

細辛 芍藥 石膏 桔梗 甘草 黃芩 澤瀉 吳茱萸 乾地黄 乾薑 一兩

右十三味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服服三劑佳

衍義 婦身素有責脈氣以病不在子藏故仍能受胎受胎之後又不慎勞動產後胸煩上氣殆所不

免氣既上逆惡露不無阻滯所以臍下重墜方用厚朴破血中滯氣桂心當歸散臍下積結芍藥地黃

除五種寒熱細辛逐寒祛陰邪茱萸乾薑下逆氣通痹結梗開胸中煩躁石膏甘草散寒熱逆氣於上
黃芩澤瀉逐水下血開於下地黃芍藥得桂心乾薑之辛散可無阻血之虞茱萸細辛得石膏黃芩之
寒化可無助熱之患任熱邪固結則當從翼方退茱萸而進大黃要在量人所稟之偏勝而為調適其
宜可也

乳養湯

治產後七傷虛損少氣不足并腎勞寒冷補氣方 牛乳之升原則白蜜一升當歸 人參
獨活各三兩大棗二十枚甘草 桂心各二兩右八味咀咀諸藥以乳蜜中煮取三升去滓分四服

衍義

產後亡血過多而致腎虛風悶故需參歸桂心溫養血氣兼取獨活搜風乳蜜潤燥甘草大棗
調和脾胃之津氣惟脾虛食少便澀者禁用

五石湯

治產後虛冷七傷時寒熱體痛乏力補腎治百病方 紫石英 鍾乳 白石英 赤石脂
石膏 茯苓 白朮 桂心 芎藭 甘草略薤白各二兩人參 當歸各三兩生薑八兩大棗
二十枚 右十五味五石并為末諸藥各咀咀以水一斗二升煮取三升六合去滓分六服若中風加葛
根獨活各二兩下痢加龍骨一兩

石膏

茯苓 白朮 桂心 芎藭 甘草略薤白各二兩人參 當歸各三兩生薑八兩大棗
二十枚 右十五味五石并為末諸藥各咀咀以水一斗二升煮取三升六合去滓分六服若中風加葛
根獨活各二兩下痢加龍骨一兩

三石湯

主百病如前方 紫石英 生薑 當歸 人參 甘草各二兩白石英 鍾乳各二兩茯苓 乾
地黃 桂心各三兩半夏五兩大棗十五枚右十二味三石為末咀咀諸藥以水一斗五升煮取三升去
滓分四服若中風加葛根四兩

衍義

產後虛冷多緣臨蓐血氣過傷不但寒熱體痛必然崩脫不止乃致清陽下溜濁陰上逆故用
紫白石英鍾乳石脂固脫參苓朮草益氣芎藭歸桂心調血石膏薤白除膈上濁邪生薑大棗和營衛寒
熱與第五卷風門中五石湯皆風引湯之發派 三石湯與五石湯主治如前然必病勢稍輕或元氣
素弱故不用乳朮之相激石脂之固脫石膏之燥進用地黃即五石湯中芍藥之義半夏即薤白之義
方後云中風加葛根與五石湯二方不異

衍義

產後虛冷多緣臨蓐血氣過傷不但寒熱體痛必然崩脫不止乃致清陽下溜濁陰上逆故用
紫白石英鍾乳石脂固脫參苓朮草益氣芎藭歸桂心調血石膏薤白除膈上濁邪生薑大棗和營衛寒
熱與第五卷風門中五石湯皆風引湯之發派 三石湯與五石湯主治如前然必病勢稍輕或元氣
素弱故不用乳朮之相激石脂之固脫石膏之燥進用地黃即五石湯中芍藥之義半夏即薤白之義
方後云中風加葛根與五石湯二方不異

衍義

產後虛冷多緣臨蓐血氣過傷不但寒熱體痛必然崩脫不止乃致清陽下溜濁陰上逆故用
紫白石英鍾乳石脂固脫參苓朮草益氣芎藭歸桂心調血石膏薤白除膈上濁邪生薑大棗和營衛寒
熱與第五卷風門中五石湯皆風引湯之發派 三石湯與五石湯主治如前然必病勢稍輕或元氣
素弱故不用乳朮之相激石脂之固脫石膏之燥進用地黃即五石湯中芍藥之義半夏即薤白之義
方後云中風加葛根與五石湯二方不異

衍義

產後虛冷多緣臨蓐血氣過傷不但寒熱體痛必然崩脫不止乃致清陽下溜濁陰上逆故用
紫白石英鍾乳石脂固脫參苓朮草益氣芎藭歸桂心調血石膏薤白除膈上濁邪生薑大棗和營衛寒
熱與第五卷風門中五石湯皆風引湯之發派 三石湯與五石湯主治如前然必病勢稍輕或元氣
素弱故不用乳朮之相激石脂之固脫石膏之燥進用地黃即五石湯中芍藥之義半夏即薤白之義
方後云中風加葛根與五石湯二方不異

內補黃耆湯

治婦人七傷身體疼痛小腹急滿面目黃黑不能飲食并諸虛之不足少氣心悸不安方

黃耆

當歸

芍藥

乾地黄

半夏

茯苓

人參

桂心

遠志

麥門冬

甘草

五味子

白朮

澤瀉

乾薑

大棗

右十六味

咀咀以水一斗煮取三升去滓

服五合日三

夜一服

衍義

此內補建中合保元四君而易乾薑溫中益氣加地黃療傷中逐血半夏治胸腹急痛遠志門

冬除心悸不安澤瀉通膀胱氣化五味子收腎藏之津氣也

吳茱萸湯

治產後虛羸盜汗瀉瀉惡寒方

吳茱萸三兩以清酒三升漬一宿煮如蟻鼻沸減得二升

許半分之頓服一升日再服日再作服亦治產後腹中疾痛

衍義

產後虛羸盜汗良由血氣虛冷濁陰擾亂於中生陽不能自固所以瀉瀉惡寒當非太陽中風

宜和營衛之比故但取專走厥陰溫中下氣之吳茱萸借清酒漬煮外充腠理以散在表之陰邪內溫

藏府以固在裏之津液此與桂枝湯治自汗之法迥乎角立

猪膏煎

治產後體虛寒熱自汗出方

猪膏

生薑汁

白蜜

一清酒

五合

右四味煎令調和五

上五下膏成隨意以酒服方寸匕

衍義

產後體虛寒熱且自汗多而津液外泄久之大便澀難所以專取猪膏蜜酒之潤以滋腸胃之

枯槁此惟脾約便秘者為宜若病人舊有微瘡者禁用

鯉魚湯

治婦人體虛流汗不止或時盜汗方

鯉魚

二斤

葱白

一升

乾薑

桂心

右五味

咀咀三物以水一斗煮魚取六升去魚內諸藥微火煮取二升去滓分二服取微汗即愈勿用生魚

衍義

河間云鯉之治水驚之利水因其氣相感也鯉專治水而體豐多汗盜汗用之者以其能散週

身濕熱之氣也更兼香豉專解陰邪葱白專通陽氣乾薑出汗逐風桂心和營散邪邪散表定無復有

汗盜汗之虞矣

桂枝附子湯 治產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸者方 桂枝 芍藥 生薑各三

草半兩 附子一枚 大棗二十枚 右六味咬咀以水七升煮取三升分三服

衍義 桂枝湯本風傷衛之專藥小便澹難亦得用之者以其多汗傷津之故良非太陽犯本之比且

見四肢微急非附子不能利其屈伸原本太陽例中病證象陽且因加附子參其間增桂令汗出之法

總由腎臟陽虛所致在產後亡陽多汗尤為合轍

虛煩第十一 方十一首

薤白湯 治產後胸中煩熱逆氣方 薤白 半夏 甘草 人參 知母各二 石膏 四兩 枳實根 三兩

麥門冬半升 右八味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二熟甚即加石膏知母各

一兩

衍義 虛煩懊懣與胸痺所爭一間虛痰痺著而痛則謂胸痺虛火擾亂不寧則為虛煩此因痰火交

混而煩熱氣逆故借胸痺薤白湯法參人竹葉石膏劑中庶痰之與火各得其平乃治虛煩之變法仍

治懊懣之正治也

竹根湯 治產後虛煩方 甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗三十枚

復煮麥熟三四沸內甘草一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取產短氣亦服之

衍義 產後虛煩不勝湯藥但以甘竹清胃火小麥飲肝氣大棗益脾津門冬滋肺熱使火無上炎之

勢胸無煩擾之患矣用根不用葉者取其降泄直達下焦也

人參當歸湯 治產後煩悶不安方 人參 當歸 麥門冬 乾地黄 桂心各一兩 大棗二十枚 梗米一升

芍藥四兩 淡竹葉三升 右九味咬咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內藥煮取三升去

滓分三服若煩悶不安者當取豉一升以水三斗煮取一升盡服之甚良

衍義 此以氣血兩虛虛火上炎而煩悶不安故用人參大棗以益氣歸芍地黄以滋血竹葉門冬梗

甘竹茹湯 治虛後內虛煩熱短氣方 甘竹茹一升人參一兩茯苓甘草各二兩黃芩三兩 右五味

吐咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

〔衍義〕 產後而見煩熱短氣急宜清補為先方中人參茯苓專補心虛甘草專益胃氣竹茹黃芩兼清

內外之熱如無外熱黃芩可無用也

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方 知母三兩芍藥黃芩各二兩桂心甘草各一

右五味咀咀以水五升煮取二升半分三服 一方不用桂心加生地

〔衍義〕 知母芍藥黃芩統治內外之熱妙用尤在桂心辛散不獨收攝上炎之火且使上三味無遏閉

之虞更以甘草和其寒熱煩悶自除矣

竹葉湯 治產後心中煩悶不解方 生淡竹葉麥門冬各一甘草二兩生薑茯苓各三兩大棗十四

小麥三合 右七味咀咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取三升去滓分三服若心中虛

悸者加人參二兩其人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏二兩

淡竹茹湯 治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解方 生淡竹茹一升麥門冬小麥各五兩甘草

一兩生薑三兩芍藥大棗十四枚黃芩三兩 右六味咀咀以水一斗煮竹茹小麥米八升去滓內諸藥煮

取二升去滓分二服病人分作三服若有人參入一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治

心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良無自依方服一劑不瘥更作若氣逆者加半夏二兩

〔衍義〕 產後雖無短氣悶亂亦無妨於補益竹葉竹茹一清肺一清胃脾胃本相接壤津氣貫通但以

胃熱上蒸而頭痛即用竹茹肺熱內蘊而煩心則用竹葉佐以茯苓使之下泄也但虛極必內人參氣

逆而嘔並用半夏是二方之功用繫繫可知

赤小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方 赤小豆三七枚燒作末以溫水和頓服之良

蒲黃散 治產後煩悶方 蒲黃以東流水和方寸匕服極良

衍義 赤小豆燒之不特清火兼可消瘀蒲黃生用功專逐血也

蜀漆湯 治產後虛熱往來心拘煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡時輒甚又如微瘧方 蜀漆葉 桂心

甘草 黃芩 芍藥 知母 芍藥 生地黄 右八味咬咀以水一斗煮取三分

三服治寒熱不傷人

衍義 草蓐中發露得風因而虛熱煩滿晡時輒甚頗有似乎瘧狀故借瘧症中蜀漆以療之蜀漆

性劣者草和之參知性寒桂心散之地黃芍藥專清血分之熱也

芍藥湯 治產後虛熱頭痛方 芍藥 乾地黄 牡蠣 桂心 右四味咬咀以水一斗煮

取二升半去滓分三服日三此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

衍義 產後虛熱煩渾是虛火上炎之候芍藥地黃專清血熱恐其開拒乃以桂心散之牡蠣能解

虛熱上蒸之頭痛以其鹹降也通身發熱加黃芩以黃芩為少陽經藥表裏風熱皆得用也

中風第十二論一首 方三十首

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無

疑大豆紫湯產後大善

大豆紫湯 治產後百病及中風痲痺或背強口噤或但煩熱若渴或頭皆重身或身癢刺者嘔逆直視

此皆因虛風冷濕及勞傷所為方 大豆 清酒 右二味以鐵鐺猛火熬豆令極熟焦煙出

以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹

中三日服此酒即瘥

衍義 黑大豆去風活血更煎酒沃通行經絡產蓐前後一切虛風關節不利等證無不宜之宜乎千

金首推也

獨活紫湯 治產後百日中風痙口噤不開并治血氣痛勞傷補腎方 獨活 一斤 大豆 五升 薑酒 三升

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之

去豆服一升日三夜二

衍義 獨活專祛風毒加於大豆紫湯中製其苦燥之性深得剛柔兼濟之妙用終嫌燥血須百日外

用之若新產暴虛恐非所宜

小獨活湯 治如前狀方 獨活 半斤 葛根 生薑 各六兩 甘草 二兩 右四味咬咀以水九升煮取三升

去滓分四服微汁佳

衍義 此純用風藥僅可施於藜藿之人若高梁黍脆諒不處是方也

甘草湯 治在蓐中風背強不得轉動名曰風痙方 甘草 乾地黄 麥門冬 麻黃 各十兩 栝蒌根

芎藭 黃芩 各三兩 杏仁 五十枚 葛根 半斤 右九味咬咀以水一斗五升酒五升合煮葛根取八升去

滓內諸藥煮取三升去滓分再服一劑不瘥更合良翼方准此有

衍義 所中風毒最重見證最急不得不以重劑發之略兼滋血潤燥可也不當以產後新虛而致失

治也

獨活湯 治產後中風口噤不能言方 獨活 生薑 各五兩 防風 秦艽 桂心 白朮 甘草 當歸

附子 各三兩 葛根 二兩 防己 一兩 右七味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服

衍義 前甘草湯治背強不能轉動純見太陽表證故用麻黃葛根以太陽之經行身後也此治口噤

不能言純見少陰風證故用附子獨活以少陰之脉循喉嚨也風濕流泊非防己防風桂心白朮無以

祛之兩不移易之定法也

雞糞酒 治產後中風及百病并男子中一切風神効方 雞糞 一升 熬豆 一升 熬令黃 聲乾勿焦 右二味以清酒

三升半先淋雞糞次淋豆取汁一服一升溫服取汗病重者凡四五日服之無不愈

衍義 內經用雞矢醴治心腹滿脹此用雞矢醴療產後中風全在黑豆淋酒取汗之力雞屬巽而祛風屬穢而祛惡也

竹葉湯 治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛方 淡竹葉一握 葛根三兩 防風二兩 桔梗 甘草 人參 桂心各一兩 附子一枚 生薑五兩 大棗十五 右十味咬咀以水一斗煮取二升半去滓分三服

日三溫覆使汗出若頸項強者用大附子若嘔者加半夏四兩

衍義 產後中風發熱面赤戴陽為患最急急進辛溫救本之藥展湯不致上逆風熱不致內攻若誤認陽明病面合赤色純行解肌不旋踵而告變矣

防風湯 治產後中風背急短氣千金翼作表急短氣 防風 獨活 葛根各五兩 當歸 芍藥 人參 甘草 乾薑各二兩 右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日三

衍義 背急表實可驗短氣內虛可憑故以人參輔正祛邪一舉而兩得其平非若虛陽上逆竹葉湯之兩難分解也千金翼作裏急短氣若作裏急恐非防葛可治也

鹿肉湯 治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方 鹿肉三斤 芍藥 獨活 秦艽 黃芩 黃芪 半夏 一升 乾地黄 桂心 芎藭 生薑 甘草 阿膠各一兩 茯苓各一兩 右十五味

咬咀以水二斗煮肉得一斗二升去肉內藥煎三升去滓內膠令烱分四服日三夜一

衍義 產後為虛風所襲非峻培氣血助其祛風之力弗克有濟若疑其有客邪不敢用補而與疎表之劑則氣隨藥脫雖有九還救無及矣即使使用補尚恐草木無情不能速為取效故取血肉之味稍兼

獨治秦艽鼓舞參芪之性不但助力祛邪并杜虛風復入真補中寓瀉之良法也

獨活湯 治產後中風方 獨活一升 桂心二兩 秦艽五兩 右三味咬咀以酒一斗半漬三日飲五合

衍義 三味漬之以酒流動血脈虛風無從可留矣

大豆湯 治產後卒中風發病倒悶不知人及姪娠挾風兼治在蓐諸疾方 大豆^{五升}枳殼^{一升}葛根^{一升}獨活^{一升}

防已^{六兩} 右四味咬咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓內藥煮取四升去滓分六服日四夜二

獨活祛風防已逐濕葛根解肌不得大豆紫湯何以司血氣之開闢

五石湯 治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫癱瘓眩胃不知人及濕痺緩弱身體痠疼妊娠百病方 紫

石莢^{三兩} 鍾乳^{三兩} 赤石脂^{三兩} 石膏^{三兩} 白石莢^{三兩} 牡蠣^{三兩} 人參^{三兩} 黃芩^{三兩} 白朮^{三兩} 甘草^{三兩} 枳實^{三兩} 芎藭^{三兩}

桂心^{三兩} 防已^{三兩} 當歸^{三兩} 乾薑^{三兩} 獨活^{三兩} 葛根^{四兩} 右十八味末五石咬咀諸藥以水一斗四

升煮取三升半分五服日三夜二 一方有滑石寒水石各二兩棗二十枚

四石湯 治產後卒中風發疾口噤癱瘓悶滿不知人并緩急諸風毒痺身體痠疼及挾胎中風婦人百

病方 紫石莢^{三兩} 白石莢^{三兩} 石膏^{三兩} 赤石脂^{三兩} 獨活^{三兩} 生薑^{六兩} 葛根^{四兩} 桂心^{三兩} 芎藭^{三兩} 甘草^{三兩}

芍藥^{三兩} 黃芩^{三兩} 右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

行義 產後非極虛寒何致卒然口噤五石湯治證最劇急需鍾乳白朮相反之性激發二莢脂膏薑

桂人參奮力祛風則防已獨活方克有濟 四石湯治證彷彿而本氣不致於傷德者於前方裁去鍾

乳白朮之反對并去人參當歸防已牡蠣枳實等味但加芍藥生薑所爭無幾而緩急輕重大淵

小柴胡湯 治婦人在蓐得風益四肢苦煩熱皆自發露所為若頭不痛但煩熱與三物黃芩湯頭痛與

小柴胡湯方 柴胡^{半斤} 黃芩^{二兩} 人參^{四兩} 甘草^{二兩} 生薑^{二兩} 大棗^{十二枚} 半夏^{半斤} 右七味咬咀以

水一斗二升煮取六升去滓每服一升日三服

三物黃芩湯方 黃芩^{二兩} 芍藥^{二兩} 乾地黃^{四兩} 右三味咬咀以水八升煮取二升去滓適寒溫服一

升日二三次下蟲

行義 邪在表裏之間而見煩熱頭痛舍小柴胡別無良法若但煩熱而無頭痛知風熱已陷血分止

宜黃芩清解外內之風熱苦參搜滌伏陽之濕熱地黃滋化血中之伏火服後多吐下蟲積者以蟲乘

二二

熱上膈得苦寒降泄則伏而不動往往隨藥而出也

甘草湯 治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病中風內絕藏氣虛所為方 甘草 芍藥各五兩

肉二斤 通草三兩 用當歸 右四味㕮咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉內藥煮取三升去滓分五服

日三夜二

羊肉湯 治產後中風久絕不產月水不利乍赤乍白及男子虛勞冷甚方 羊肉二斤 成瘻大蒜切皮

香鼓格三 右三味以水一斗三升煮取五升去滓內酥一升更煮取三升分溫三服

行義 太陽病服陽旦湯惡寒脚攣急服甘草乾薑湯厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸產後腹中疝痛主以當歸生薑羊肉湯此治產後腹中傷絕寒熱暴病乃獨取羊肉溫補精血芍藥甘草

獲持營氣則傷絕可復寒熱可除用通草者通達氣化之阻絕也產實易當歸通血室之阻絕也羊肉湯治風入胞門固疾故用蓯蓉濁惡之味與羊肉香鼓同煮以蓯蓉辟除惡氣鼓能解散穢腐更內

乳酥之潤引領瘀垢下趨當歸生薑羊肉湯之變法也

葛根湯 治產後中風口噤瘰癧氣急迫急眩胃困頓并產後諸疾方 葛根 生薑各六兩 獨活 四兩 當

歸三兩 甘草 桂心 茯苓 石膏 人參 白朮 芍藥 防風各二兩 右十二味㕮咀以水一斗

二升煮取三升去滓分三服日三

行義 產後中風口噤瘰癧雖用芍藥當歸膏薑愈風之品不得苓桂朮甘四君子等藥無以逞其功用也醫之上拙於此可徵

防風酒 治產後中風方 防風 獨活各一兩 女萎 桂心各三兩 茵芋 一兩 石斛 五兩 右六味㕮咀以

酒二斗漬三宿初服一合稍加至三四合日二

治產後中風風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方 獨活 八兩 當歸 四兩 右二味㕮咀以酒八升煮取

四升去滓分四服日三夜一取微汗上氣者加桂心二兩不發更作

治產後中風風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方 獨活 八兩 當歸 四兩 右二味㕮咀以酒八升煮取

四升去滓分四服日三夜一取微汗上氣者加桂心二兩不發更作

治產後中風風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方 獨活 八兩 當歸 四兩 右二味㕮咀以酒八升煮取

四升去滓分四服日三夜一取微汗上氣者加桂心二兩不發更作

木防己湯 治產後中風方 木防己 黃芩 芍藥 甘草 右二味咬咀以苦酒九升漬一宿猪膏四升煎

三上三下膏成灸手厚十遍瘥

浴湯 治產後中風流腫方 鹽 雞毛 右二味以水一石煮鹽作湯內雞毛灰著湯中

適令暖以浴大良人浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破者以藥湯一服瘥神効 藥湯即前

藥湯 產後中風而用獨活黃芩等味柔風而用獨活當歸酒皆背城決戰法以圖萬一之倖若生

機未定者豈別無他法耶至於外用厚膏用漆法不獲已而為之然不若大豆紫湯之妙用虛實逆從

總無妨礙

治產後中風頭面手臂通滿方 大豆三升以水六升煮取一升半去豆澄清更煎取一升內白朮八兩

附子獨活各三兩生薑八兩漆水一斗煎取五升內好酒五升合煎取五升去滓分五服日三夜二間

粥頻服三劑

桂枝湯 此以朮附湯加獨活生薑入大豆紫湯中非但治方下諸病即頭風偏正皆得瘥之

茯苓湯 治產後忽苦心中衝悸或忘意不定恍惚言諸錯謬心虛所致方 茯苓 人參 茯苓

芍藥 甘草 當歸 桂心 芍藥 生薑 大棗 右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分

三服日二夜一良

遠志湯 治產後忽苦心中衝悸不定忘意不安言語錯謬恍惚憤憤不自覺方 遠志 麥門冬

人參 甘草 當歸 桂心 芍藥 一兩茯苓 五兩生薑 六兩大棗 二十枚 右十味咬咀以水煮取

三升去滓分三服日三服者分四服產後得此正是心虛所致無當歸用芍藥若其人心胸逆氣加半復

茯苓湯 治產後忽苦心中悸不定言語錯謬恍惚心中憤憤此皆心虛所致方 茯苓 甘草 芍

藥 桂心 當歸 芍藥 六兩麥門冬 一升大棗 三十枚 右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分

三服日三無當歸可用芍藥若苦心志不定知人參二兩亦可內遠志二兩若苦煩悶短氣加生竹葉

一升先以水一斗三升煮竹葉取一斗內藥若有微風加獨活三兩麻黃二兩桂心二兩用水一斗半升若頭項苦急背膊強者加獨活葛根各三兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用水一斗半

安心湯

治產後心衝悸不定恍惚惚不自知覺言語錯謬虛煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志

甘草略二人參 茯神 當歸 芍藥略三麥門冬一升大棗三十 右八味咬咀以水一斗

煮取三升去滓分三服日三若苦虛煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹葉取一斗內藥若胸

中少氣者加甘草為三兩善

金匱

金匱有云產後常服建中散劑則諸病不生千金加當歸一味名曰內補當歸建中湯無論有

無邪皆可服之以其專力和營也四方皆出內補當歸建中一加參苓茯神一加麥冬冬志一加茯

苓門冬一加參神冬志而不用桂心生薑總主心虛衝悸恍惚錯謬但虛甚必加人參無參多加茯苓

志亂則加遠志神傷須用茯神去桂心生薑者以神氣內耗恐其卒散走津液也觀方下有云無當歸

用者及後甘草九方後云苦無澤瀉白朮代之則茯神遠志雖有心腎之分却無上下異治也

甘草圓

治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸乏氣或若恍惚惚不自知覺者方 甘草 遠志

葛蒲

治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸乏氣或若恍惚惚不自知覺者方 甘草 遠志

豆酒服

二十九日四五服夜再服不知稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增乾薑

人參圓

治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣方 人參 甘草 茯苓

各三

麥門冬 葛蒲 澤瀉 薯蕷 乾薑略二桂心一兩大棗五十 右十味為末以蜜為膏和凡

如梧子末食酒服二十凡日三夜一不知稍增若有遠志內二兩佳若風氣加當歸獨活各三兩亦治

男子心損虛悸

大遠志圓

治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍惚惚腹中拘急痛夜臥不安胸中吸吸少氣內

補陽損益氣安安心神亦治虛損方 遠志 甘草 乾地黃 桂心 茯苓 麥門冬 人參 當

末食溫酒服三十九日三不知稍增至五十丸若大虛身體冷少津液加鍾乳三兩為善
右十五味為末蜜和丸如大豆

行義 千金用參苓補虛多兼薑桂化熱多兼附冬不獨甘草丸為然當浦遠志引領諸味桂心澤瀉

淡滲導虛熱下泄其人參凡即於甘草丸中退遠志而進薯蕷方下所言有遠志加一兩若風氣加當歸獨活即是遠志丸範子歸地膠朮功倍棗膏至於太虛身體冷加鍾乳以對白朮功力未可限量
心腹痛第十三方二十六首

蜀椒湯 治產後心痛此大寒冷所為方 蜀椒二合 芍藥 當歸 半夏 甘草 桂心 人參 茯苓

各兩 蜜一斤 生薑汁五合 右十味㕮咀以水九升煮椒令沸然後內諸藥煮取二升半去滓內薑

汁及蜜煎取三升一服五合漸加至六合禁勿冷食

行義 產後心痛諸痛總宜溫理血氣內補當歸建中功專和營解脾產後恆宜服之此以本氣虛寒

故於本方加入蜀椒人參茯苓半夏溫散胃家痰氣生薑用汁取其迅速蜜代飴棗不獨安中兼滋桂心半夏之燥也

大巖蜜湯 治產後心痛方 乾地黄 當歸 獨活 甘草 芍藥 桂心 細辛 小草 各二兩 吳茱萸

黃一升 乾薑三兩 右十味㕮咀以水九升煮取三升內蜜五合重煮分三服日三 胡洽不用獨活桂心

行義 此亦出之建中前以胃氣虛冷故用椒半參苓此以胃寒血燥亦於建中除去飴棗而易蜂蜜不

用薑汁而用乾薑取其力專守中加吳茱萸溫中下氣止痛細辛治咳逆利九竅乾地黄補益安中皆

本經主治也 詳後二十六卷賊風門中大巖蜜湯無蜂蜜獨活甘草多半脂梔子茯苓小巖蜜較大

巖蜜無梔子茯苓多半大巖蜜黃總取羊脂法風潤燥實脾和營代此方中蜂蜜以和薑更辛桂之烈也

乾地黄湯 治產後兩脅滿痛兼治百病方 乾地黄 芍藥 當歸 蒲黃 各二兩 桂心 六

兩 甘草一兩 大棗二十 右八味㕮咀以水一斗煮取一升半去滓分三服日三

千金要方 卷三 二十八

行義

產後雖兩脅滿痛而無寒熱往來知非少陽客邪仍須內補建中加地黃輔佐歸芍和營加清

黃輔佐

桂心散血以肝血不能循經輸運而流入少陽部分故專散血為主

芍藥湯

治產後苦少腹痛方

芍藥六兩

桂心

生薑各三兩

甘草二兩

膠飴八兩

大棗二十枚

右六味

咀咀水七升煮取四升去滓內飴令烊分三服日三

行義

腹痛而用建中兩陽先聖治調千金產後施治亦不出此

當歸湯

治婦人寒病虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸

芍藥各二兩

桂心

生薑五兩

羊肉斤一

右四味

咀咀以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得三升適寒溫服七合日三

行義

金匱治腹中疝痛用當歸生薑羊肉湯辛溫散結其痛立愈凡少腹疝痛用桂心等藥不應者

用之輒効芍藥酸寒為產後禁藥千金濁取以加入此湯張得辛甘相配散中寓收之妙用原從建中

悟出胡洽未達此義

桃仁芍藥湯

治產後腹中疝痛方

桃仁半升

芍藥

當歸

乾漆

桂心

甘草各一

右

七味

咀咀以水八升煮取三升分三服

行義

產後惡露不行而痛雖非建中所宜然亦不能捨此於中除去薑棗加入桃仁當歸乾漆專攻

瘀積使無留結之患倘傷殘之餘雖勝峻攻者較鯁蠱蟲代用亦無不可

羊肉湯

治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風方

肥羊肉

二斤

無羊肉

茯苓

黃耆

乾薑各三

甘草

獨活

桂心

人參

麥門冬

生地黄

黃五兩

大棗

右十一味

咀咀以水二斗煎

肉取一斗去肉內藥煮取二升半分四服日三夜一

羊肉當歸湯

治產後腹中風下切痛不能食往來寒熱中風之氣方

羊肉三斤

當歸

黃芩

用散

著

防風

甘草

芍藥

生薑

四兩

右八味

咀咀以水一斗二升先煮肉減半

內餘藥取三升去滓分三服日三

羊肉生地黄湯

治產後三日腹痛補中益氣

羊肉

生地黄

黃芩

芍藥

甘草

防風

右八味

咀咀以水一斗二升先煮肉減半

內餘藥取三升去滓分三服日三

羊肉生地黄湯

治產後三日腹痛補中益氣

辛 款冬花 人參 厚朴 芎藭 附子 草薢 甘草 黃耆 白朮 桂心 附子 五味子 細
八味咀咀以水一斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥取三升半去滓分五服日三夜二

羊肉生地黃湯

治產後三日腹痛補中益臟強力消血方 羊肉三斤 生地黃切 桂心 當歸 甘

草 芎藭 人參

各二兩 芍藥三兩

右八味咀咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煎取三升分四服

日三夜一

行義

羊肉湯治產後大虛雖有客邪若行表散元氣立脫故需羊肉氣血之屬煮保元輩急固本

略取獨活一味專主下陷之邪并佐乾薑桂心調和血氣之品深得養正祛邪之妙用也 羊肉當歸

湯以有寒熱往來雖無腹中絞痛亦須當歸生薑羊肉溫補散邪芎藭芍藥護持營血防風黃芩雖散

表熱實通血閉肘後不用防風黃芩而用人參黃耆胡洽以黃耆代黃芩白朮代芍藥子母秘錄以桂

心代防風並可為法 羊肉杜仲湯專主產後大虛寒濕痺著而腰痛虛風內襲而咳喘故合芎而用

參附著附朮附桂附薑附兼附子理中湯甘草附子湯等方之製峻用辛溫以開下著之痺細辛甘草

以散上浮之咳薑桂辛散五味收之著朮氣壅厚朴泄之草解杜仲濕者腰痛之響導紫苑欬冬風淫

喘咳之專司種種主治仍藉當歸生薑羊肉湯鼓舞之力 羊肉生地黃湯以治新產腹痛乃兼取當

歸生薑羊肉湯內補當歸建中湯二方除去薑棗膠飴加入人參芍地平調血氣桂心行芍地之寒滯

人參助羊肉之滋益也

內補當歸建中湯 治產後虛羸不足腹中痠痛不止呼吸少氣或若小腹拘急痛引腰背不能飲食產

後一月日得服四五劑為善令人力壯方 當歸四兩 芍藥五兩 甘草二兩 生薑六兩 桂心二兩 大棗

十八 右六味咀咀以水一斗煮取三升去滓分三服一日令盡若大虛內飴糖六兩作湯成內之於

火上煖令飴消若無生薑則以乾薑三兩代之若其人去血過多崩傷內竭不止加地黃六兩阿膠二

兩合八種作湯或去滓內阿膠若無當歸以芎藭代之

內補芎藭湯 治婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中絞痛方 芎藭 地黃各四兩 芍藥 五兩 桂心 二兩

甘草 乾薑各三兩 大棗四十枚 右七味以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三不瘥復作

至三劑若有寒苦微下加附子三兩治婦人虛羸少氣傷絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及唾吐血甚良

大補中當歸湯 治產後虛損不足腹中拘急或溺血少腹苦痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男

子亦宜服之方 當歸 續斷 桂心 芎藭 乾薑 麥門冬各三兩 芍藥四兩 吳茱萸 一升 乾地黄

六兩 甘草 白芷各二兩 大棗四十枚 右十二味以酒一斗漬藥一宿明旦以水一斗合煮取五升

去滓分五服日三夜二加黃耆二兩益佳

行義 南陽用小建中治傷寒陽脈濡陰脈弦腹中急痛及尺中脈遲營氣不足之證金匱加黃耆治

虛勞裏急諸不足用法奇至千金於小建中加當歸謂之內補當歸建中湯變化尤奇而於產後隨證

加減無所不宜南陽從容邪內犯起見故用桂枝千金從肝血內滯起見且西莊風氣剛勁桂枝力薄

不能透達表邪故咸用桂心然古方中多有但一桂字者則當隨內外見證而為取用 其內補芎藭

湯即是內補當歸建中方後加減以崩傷去血過多虛竭腹中絞痛非芎藭地黃胡能急救脫亡地黃

膩膈乾薑發之乾薑薑導生薑專散進彼退此非無深意存焉既有芍地之滋益棗飴可無用也 大

補中當歸湯合前兩方諸味更加吳茱萸以佐乾薑麥門冬以佐地黃續斷以佐芎藭白芷以佐桂芍

也用酒漬者專行和血止痛也

桂心酒 治產後小腹痛及卒心腹痛方 桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三

牛膝酒 治產後腹中苦痛方 生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若用乾薑牛膝根以酒漬

一宿然後可煮

治產後腹中如弦常堅痛無神方 當歸末二方寸匕內蜜一升煎通寒溫頓服

行義 桂心散寒結牛膝導氣結並宜酒煮以行其芎當歸和血又宜蜜煎使緩行其性故無諸於酒煎也

吳茱萸湯 治婦人先有寒冷胸滿痛或心腹刺痛或嘔吐食少或腹或寒或下痢氣急綿腹欲結產後益劉皆主之方 吳茱萸二兩 防風 桔梗 乾薑 甘草 細辛 當歸各針乾地黃針八 右八

味啖里以水四升煮取一升半去滓分再服

行義 先有寒明非暴受之寒也胸滿痛而且嘔吐食少或浮腫或下痢一切都是裏證故用薑黃細辛以溫其胃當歸地黃以滋其血防風桂心以拓其氣即產後益劇亦不出此

蒲黃湯 治產後餘瘀胸中少氣腹頭痛疼餘血未盡除腹中脹滿欲死方 蒲黃 生地黄 生薑各

兩 桂心各 芒硝二兩 桃仁七 大棗十五 右八味以咀以水九升煮取二升半去滓內芒

硝分二服日三服

行義 產後瘀血未淨而腹脹滿痛為證最急泄滿最為吃緊蒲黃散血更須芒硝佐之則桂心桃仁等味方得振迅掃之戰耳

敗醬湯 治產後瘀痛引腰腹中如錐刀所刺方 敗醬 三兩 桂心 芎藭 各二兩 當歸 一兩 右四味以

咀以清酒二升水四升煮取二升去滓通度溫服七合日三食前服之 千金集只用

行義 產後瘀塊引痛如錐須仿於結成癰故借金匱意以敗醬附子散之法於中除去附子之煩發

進以芎歸之柔和可無難成之患矣

芎藭湯 治產後腹痛方 芎藭 甘草 各二兩 蒲黃 女威 各兩 芍藥 大黃 各三兩 當歸 針八 桂心 桃

仁 黃芩 各半兩 附子 各一兩 地黃 一升 右十二味以咀以水一斗酒二升合煮取三升去滓分四

服日三夜一

行義 却前痛黃湯之變法欲用之請專治婦人結此胃大黃兼清血熱

獨活湯 治產後腹痛引腰背拘急偏方 獨活 當歸 桂心 芍藥 生薑 甘草 大棗

此方 治心氣吐逆以水八升煮取三升去滓分三服服後稍去如人行十里久再進

行義 於內補當歸建中除去膠脂之濕賦特進獨活以散風氣血結也

芍藥黃芩湯 治產後心腹脹痛方 芍藥 黃芩 白芍 桂心 生薑 人參 芍藥 當歸 乾

地黃 甘草 兩各二升 茯苓 三兩 大棗 十枚 右十二味以酒水各五升合煮取三升去滓先食服一

升日二升 全無人參當歸

行義 此以血氣虧損而致心腹脹痛故用保元合內補當歸建中之製更加芍地以滋衝脈之虛芍

並以散子戶之風也

治產後腹痛不可忍者方 煮大棗根為飲一服即愈

行義 黍粘能通行十二經其根下行散血故單取用之

治婦人心痛方 布裹鹽如彈丸燒作灰酒服愈

行義 鹽能降 燒之以灰取同氣以導陰火用酒服之更能和血

又方 燒秤銕投酒中服亦佳

行義 燒鐵漬酒專取下氣

又方 炒大豆投酒中服佳

行義 大豆紫湯詠風潤燥滋腎和營無所不宜

惡露第十四方二十八首

乾地黃湯 治產後惡露不盡除諸疾補不足方 乾地黃 三兩 芍藥 桂心 黃芩 當歸 各二

升 防風 茯苓 細辛 芍藥 甘草 各一 右十一味以水一斗煮取三升去滓分三服日

行四湯之帶通而惡露自下此方以治之也 惡露不盡除諸疾補不足方 乾地黃 三兩 芍藥 桂心 黃芩 當歸 各二

再夜一

衍義 產後惡露未盡勢在必攻而攻之之法不但諒人虛實且有實偏勝之不同或兼挾何邪而致病豈一破血之法可藥治乎此方以保元四物兼補氣血佐細辛防風以行保元之力桂心茯苓以行四物之滯滯通而惡露自行本虛挾血之良法也

桃仁湯 治產後往來寒熱惡露不盡方 桃仁五兩 吳茱萸二升 黃耆 當歸 芍藥各三兩 生薑 醃

衍義 此因惡露不通而凡往來寒熱故用桃仁芍藥散血即兼黃耆當歸補血柴胡吳茱萸生薑專為寒熱而設吳茱萸散內癰之血柴胡生薑開外鬱之氣用醃者專通血結產母癰約之故若大便不固殊非所宜觀後柴胡湯可知

澤蘭湯 治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背少氣力方 澤蘭 當歸 生薑 生地黃

服亦瘥 各三甘草一兩 芍藥一兩 大棗十枚 右七味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日三墮身欲死

衍義 澤蘭為產後去宿生新要藥與丹參功用不殊濟以地黃歸芍調血之品和以甘草輩東平散之味不獨惡露可通即小產去血過多亦能療之總藉去宿生新之力

甘草湯 治產乳餘血不盡逆搶心胸手足逆冷脣乾腹脹短氣方 甘草 芍藥 桂心 阿膠各三兩

衍義 四味溫血藥中特進大黃一味以破逆上之血大黃雖苦寒得桂心之辛散功用自不尋常一日一夜盡此三升即下腹中惡血一二升立瘥當養之如新產者

服入腹面即有色豈非宿有所驗乎 大黃湯 治產後惡露不盡方 大黃 當歸 甘草 生薑 牡丹 芍藥各三兩 吳茱萸一升 右七

服入腹面即有色豈非宿有所驗乎

味吹咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加人參二兩名人參大黃湯

衍義 前用桂心以鼓大黃之性此用吳萸以行大黃之力用當歸牡丹即有前方阿膠之義生薑佐

吳萸可抵桂心之辛散也

柴胡湯 治產後往來寒熱惡露不盡方 柴胡 生薑各八兩 桃仁五十 當歸 黃耆 芍藥各三兩 吳萸

二升 右七味吹咀以水一斗三升煮取三升去滓先食服一升日三服 酒一斗

衍義 此方主治與桃仁湯無異但少醍醐一味以保產後痺氣

蒲黃湯 治產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝胸脇時時煩憤逆滿手足痛疼胃中結熱

方 蒲黃十兩 大黃 芒硝 甘草 黃芩 各一兩 大棗三十 右六味吹咀以水五升煮取一升清朝

服至日中下若不止進冷粥半盞即止若不下與少熱飲自下人羸者半之 黃芩湯無芒硝

衍義 產後積血不去而致腹大氣短不急攻之變證莫測蒲黃硝黃破血猛劑恐其疾行乃以甘草

和之黃芩專清鬱積之標熱也

銅鏡鼻湯 治產後餘疾惡露不除積聚作病血氣結搏心腹疼痛方 銅鏡鼻十八枚 大黃二兩 芍

藥 乾地黃 芎藭 乾漆 芒硝 各二兩 亂髮雞子大棗三十

合去滓內髮灰鏡鼻末分三服 右九味吹咀以水七升煮取二升二

小銅鏡鼻湯 治如前狀方 銅鏡鼻十枚 大黃 甘草 黃芩 芒硝 乾地黃各二兩 桃仁五十 右

七味吹咀以酒六升煮取三升去滓內鏡鼻末分三服亦治通尸心腹痛及三十六尸疾

衍義 產後惡露不除日久而成積聚雖有大黃芒硝乾漆地黃之屬不能消磨堅積故取銅鏡之鼻

以磨礪之深契本經主治女子血閉癥瘕之旨芍藥芎藭髮灰太棗乃乾漆之佐使耳 小銅鏡鼻湯

方下雖云治如前狀詳方中藥味必竟其勢稍緩或元氣委頓難勝乾漆峻攻故但用桃仁黃芩甘草

酒煮以行藥力方後言亦治通尸心腹痛者取銅鏡鼻鎮邪不能遁形之義

梔子湯 治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛方 梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二兩蜜五合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二升分三服日三

行義 產後血流不盡而用梔子之苦寒豈無傷中之慮乎詳本經梔子治五內邪氣胃中熱氣能降火從小便泄去是必產母平昔多火大便燥實方可用之若舊有微瘡諒不犯南陽之禁也

生地黃湯 治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不通方 生地黃五兩生薑三兩大黃芍藥茯苓細辛桂心當歸甘草黃芩各半大棗二十枚右十一味咬咀以水八升煮取

二升半去滓分三服日三

行義 即前大黃湯之變方大黃芍藥當歸甘草生薑等味俱出大黃湯其用桂心細辛即大黃湯中吳茱萸之意黃芩茯苓即大黃湯中牡丹之意大棗佐黃芩以和寒熱也方下雖不言寒熱而用黃芩

薑棗之意可推

大黃乾漆湯 治新產後有血腹中切痛方 大黃乾漆乾地黄桂心乾薑各三兩五味咬咀以水三升清酒五升煮取二升去滓溫服一升血當下若不瘥明旦服一升滿三服病無不瘥

行義 此從銅鏡鼻湯兩方中化出以瘀積未久未成癥瘕與銅鏡鼻無預故但取前方之漆灰次方之清酒而加乾薑桂心溫散可也

麻子酒 治產後血不去方 麻子五升擣以酒一斗漬一宿明旦去滓溫服一升先食服不瘥夜服一

升當吐下忌房事一月將養如初產法

行義 本經言麻子仁補中益氣日華言止消渴通乳汁總取潤燥利竅之力既通乳汁則去血不言

而喻

升麻湯 治產後惡物不盡或經一月半歲一歲方 升麻三兩以清酒五升漬煮取二升去滓分再服

當吐下惡物勿怪良

衍義 升麻升清陽降濁氣漬之以酒而升騰胃氣胃氣有權濁惡自不能留矣所患雖久而元氣未漓無患升動逆氣也

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方 大黃 黃芩 桃仁各三兩 桂心 甘草 當歸各二兩 芍藥二兩 生地黃六兩 右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓食前分三服

衍義 於前生地黃湯中除去細辛茯苓棗薑易入桃仁一味破血之力較生地黃湯更專然非大滿大痛皆難輕試

治產後漏血不止方 露蜂房 敗船茹 右二味等分作灰取酪苦漿服方寸匕日三

衍義 露蜂房本經治驚癇癰瘕寒熱邪氣敗船茹乃桐油石灰黃麻結成並為逐垢散血之藥兼取填塞其空之義酪苦漿即點乳酪之酸漿也

又方 大黃三兩 芒硝一兩 桃仁 水蛭 蠱蟲各二枚 甘草 當歸各二兩 蠱蟲四十枚 右八味咬咀以水三升酒二升合煮取三升去滓分三服當下血○又方 桂心 蟻蠃各二兩 梔子根 牡丹各三兩 豉一升 右五味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服

衍義 抵當而兼下瘀血湯之製破血之猛劑也 又彷彿金匱土瓜根散之製彼用土瓜根此用梔子根彼用蟻蠃此用蟻蠃彼用芍藥此用牡丹彼用桂枝此用桂心香豉者專散穢惡之氣也

治產後血不可止者方 乾薑三兩 以清酒五升漬煮取三升分再服即止

衍義 專取利竅之品清酒漬煎以活血散瘀瘀散而血得歸經矣

治產後惡血不除四體並惡方 續骨木二十兩 破如箕子大以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血下即瘥此木得三遍煮

衍義 續骨木專散血血散而肢腫自除以氣味穢濁恐其傷胃須與粥食間進助其勢力

湯服方寸匕日再服一稍加至二七〇又方 鹿角燒成灰搗篩煮散汁服方寸匕日三夜再稍加至二七〇不能服散清者水作湯服之〇又方 搗生藕取汁飲二升甚驗〇又方 生地黃汁一升酒三合和溫頓服之〇又方 赤小豆搗散取東流水和服方寸匕不瘥更作

行義 血下不盡不可再攻煩悶腹痛又難用補因取羚羊之入肝搜風而散惡血燒之使寓止脫之義乃合金遺散實為靈散專泄煩悶腹痛也 鹿角走督脉本經言治漏下惡血燒之亦能止血服用豉汁取散散之氣也 生藕散血而且通行經絡產後尤宜 生地黃汁專主血熱妄行以其性寒恐其滋滑乃以酒和服 赤小豆清熱散火火散血亦隨之而散矣

治產後血凝方 古鐵一斤秤銼斧頭鐵杵亦得炭火燒令赤內酒五升稍稍服之神妙

行義 燒鐵漬酒下氣最速因取素問治湯厥生鐵烙飲之法更藉酒力以行血瘀不獨產後主治也

治婦人血凝心腹積聚產乳餘疾絕生小腹堅滿貫臍中熱腰痛小便不利大便難不下食有伏蟲臌脹難瘕腫久寒留熱胃脘有邪氣方 半夏六兩石膏 煎蘆 牡蒙 茯苓各八兩桂心 乾薑各一

烏象 半斤 已立如神 右凡味為末蜜丸如小豆服二凡日三及治男子疝病

行義 血凝積聚而致臌脹且見證難合不得不以難合治之方中半夏滌痰石膏清熱煎蘆涌吐牡蒙散邪茯苓潤桂心溫血乾薑溫氣烏喙破瘀已豆攻積藥雖峻而所服最少久積之瘕勢在漸磨故用峻劑後大深得治瘕之奧

治婦人血凝痛方 乾薑 烏賊魚骨 各一 右二味治下篩酒服方寸匕日三〇又方 末桂心溫酒

服方寸匕日三

行義 許證堅積難難吐利並行毒藥猛進未可定其必効此方亦主血瘕僅用烏賊以散結血乾薑以溫中氣養血非氣不行結非溫不散素問四烏鯁一蘆其如丸之變法也 又方單用桂心一味為末專行溫散且酒服之以助桂心之力彙萃諸方出入之旨則產後散血諸例了無餘蘊矣

下痢第十五 方十九首

膠蠟湯

治產後三日內下諸難五色痢方

阿膠

黃柏

各一蠟如梧子三枚

當歸半兩

黃連二兩

陳廩米

一升

右六味以水八升煮米蟹目沸去米內藥煮取二升去滓內膠蠟令烱分四服一日全盡

衍義

滯下雖有寒熱新久之不同而推陳致新之治則一至於產後新虛雖有瘀積猶須顧慮本元

兄有臨月先期而延及產後者得不更為扼腕耶此以新產暴注熱邪勢甚恐其凌燂真陰不得拘於產後苦寒之禁乃峻投連柏以堅腸胃之崩迫歸膠以滋營氣之虛燥蜂蠟以安膿血之絕傷陳米以資胃氣之軟化此駐車丸之支流於中除去乾薑而加黃柏米蠟也按駐車丸亦千金所立專調腎脾肺三車之氣以鹿車之力過疾則以橫連駐之牛車之力過緩則以乾薑御之羊車之力過勞則以阿膠滋之而駕馭三車者血與氣耳用當歸者藉以統攝傷殘之餘不使更失常度而論腎不止也夫產後虛能受熱宜溫理中氣何反除去辛溫而進苦寒是必西北風氣剛勁資稟偏陽難勝辛熱所以去彼取此設當東南水土卑弱軀體柔脆又當依賴乾薑而遠黃柏矣孰謂異法方宜之可忽乎

桂蜜湯

治產後陰寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血方

桂心

甘草

乾薑各二兩

附子

蜜升當歸三兩

赤石脂兩

右七味以水六升煮取三升去滓內蜜煎一兩沸分三服日三

衍義

夫蜜潤腸下痢所禁反取用之以產後泄脫無度非四逆桃花無以療之雖證屬虛滑而痢久

津液逮匱急需滋乾導滯以協濟之效之本草蜜性雖滑熱則溫中薑雖辛熱炮則苦平可知蜜有和解辛熱之功薑且散火安中之力而桃花湯中粳米煎膠蠟湯中已借用之此方既有桂心當歸甘草熟蜜溫中和血可無藉於粳米也

治產後下赤白腹中絞痛方

芍藥

乾地黄各五兩

甘草

阿膠

艾葉

當歸各二兩

右六味以水九升煮

水七升煮取二升半去滓內膠令烱分三服

以水六升煮取三升半去滓內膠令烱分三服

取三升去滓分三服此方神驗亦可以水五升酒一斗煎取四升分四服

治產後痢赤白心腹刺痛方 薤白一兩當歸二兩酸石榴皮三兩地榆根四兩粳米五合 右五味吹

咀以水六升煮取二升半去滓分三服

行義 前方以產後血虛痛痢不止故於金匱膠艾湯中但去芎藭一味彼治妊娠漏下固為必需此

主產後滯下似可無藉非有所妨礙而去之也 次方以瘀積流泊於經而致身面浮腫故用大豆小

麥以通達腎肝之氣俾榮更清黃得振破瘀之力 後方專取南陽四逆散後雖白治腹中痛泄利下

重及金匱胸痺方疎利濕熱之義榴皮酸石榴皮利之薤白世滯當歸和之粳米專扶胃氣之陷也

當歸湯 治產後下痢赤白腹痛方 當歸 龍骨 乾薑 白朮 芍藥 甘草 白艾 熟者

附子 右八味吹咀以水六升煮取二升去滓分三服一日令盡

行義 產後氣血兩虧加以下痢脾胃俱虛艾附本附薑附艾力復陽當歸芍藥溫養其血至於龍骨

飲固其津甘草調和其氣並緩附子之性一舉而兩得之也

白頭翁湯 治產後下痢兼虛極方 白頭翁 阿膠 秦皮 黃連 甘草 黃柏 三兩 右六味

吹咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三服日三

行義 南陽以此方治厥陰熱痢下重金匱加甘草阿膠治產後下痢虛極其前膠蠟湯雖出駐車尤

為此方的派要之二方皆滯下門中頂門金錄

驚甲湯 治產後早起中風冷泄痢及帶下方 驚甲 枳實 當歸 黃連 乾薑 黃柏 長三尺 右

五味吹咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

行義 本經言驚甲治心腹癢積聚而兼連柏專祛濕熱乾薑熱因熱用之嚮導當歸和其血滯為

熱劑之的方方下雖言產後早起風冷致病邪既入裏而蘊熱必無外散之理世有因風致病尚欲牽

纏表藥者不幾癡人說夢耶

二

龍骨圓 治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼治產後惡露不斷方 龍骨四兩 乾薑 甘草 桂心

右四味為末蜜和丸暖酒服二十丸如梧子日三 一方用人參地黃各二兩

行義 本經言龍骨治泄利膿血女子漏下而兼乾薑桂心溫散寒結甘草專和胃氣為冷痢之專藥

畫桂辛散不須復用響道也

阿膠圓 治產後虛冷洞下小腹絞痛兼泄瀉不止方 阿膠四兩 人參 甘草 龍骨 桂心 乾地

黃 白朮 黃連 當歸 附子 右十味為末蜜丸如梧子大溫酒服二十九日三服

行義 方下雖主虛冷洞下而證見本寒標熱故彙推理中駐車及本門中龍骨圓三方並去乾薑而

易附子功力倍增阿膠當歸專補營虛人參白朮專扶胃弱桂心附子專治本寒黃連一味專除標熱

猶恐桂附過熱乃進地黃以護真陰龍骨以填滲漏非但防虛陽之竊發并可杜虛寒之下脫也

澤蘭湯 治產後餘疾寒下凍膿裏急胸脇滿痛咳嗽嘔血寒熱小便赤黃大便不利方 澤蘭 石膏

各二十當歸 甘草 厚朴 防風 吳茱萸 細辛 桑白皮 麻子仁 桔梗 乾地黃 白

朮 蜀椒 白芷 柏子仁 咀以水一斗五升先內桑白皮煮取七升半去之內諸藥煮取三升五合去滓分三服

行義 澤蘭入肝脾血分為產後要藥用以配入理中并取椒辛茱萸朴之屬協助參朮以治寒下凍膿

裏急胸膈滿痛主使歷然其餘芍藥本防風白芷遠志桑皮桔梗當歸地黃石膏麻仁柏仁等味皆

為咳嗽嘔血小便赤黃大便不利隨證參入學者不必師其成則也

乾地黃湯 治產後下痢方 乾地黃二兩 白頭翁 黃連 蜜蠟 阿膠 右五味咀咀

以水五升煮取二升半去滓內膠蠟全烱分三服日三

行義 於白頭翁加甘草阿膠湯中除去秦皮黃柏但用黃連以堅腸胃白頭翁以止腹痛阿膠以治

下痢也黃以除血熱蜜蠟以清胃氣本經專主下利膿血以蠟味至淡入胃胃為五臟之本淡為五

生地黃湯

治產後忽著寒熱下痢方

生地黃 五兩

甘草

黃連

桂心 略

一大棗 二十枚

赤石脂 二兩

淡竹葉

作竹皮

右七味以水一斗煮竹葉取七升去滓內藥煮取二升半分三服日三

行義

方下言忽著寒熱下痢是飲食中寒熱交進或飽食後臍腹受冷飲食不化而溫熱與外感之

寒熱無預也方中桂心專治寒黃連專化溫熱淡竹地黃專行清熱甘草大棗專於和中石脂一味專固下焦之脫也

藍青圓

治產後下痢方

藍青 附子

鬼白

蜀椒

兩各一厚朴

阿膠

甘草 略二

艾葉

龍骨

黃連

當歸 各三兩

黃柏

茯苓

人參 略一

右十四味

為末

蜜和丸

如梧子

每服二十丸

空腹飲下

一方用赤石脂四兩

赤石脂圓

治產後虛冷下痢方

赤石脂 三兩

當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

甘草 略二

蜀椒

附子 各一兩

右九味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日三

服

金翼作散空

服方寸匕

行義

夫病有常變治難一揆產後滯下而至寒熱交錯毒邪膠固於內連柏不足以挫其威參附不

足以固其脫法無可愈之機乃取法外之法以治變中之變藍青鬼白本經雖有解毒殺蠱之治本草

小青條下且主血痢腹痛但世罕知用其他蜀椒龍骨為痢久虛滑而設膠艾當歸為肝虛血脫而設

甘茯苓補為脾虛氣滯而設則又不離於常度也

赤石脂丸治證雖同然必較前稍緩故投劑稍平

而寒熱交錯則一所以方中椒薑附子與秦皮黃連並行無悖白朮當歸與石脂甘草協力匡扶方克

有濟以無毒邪固結乃無藉於藍青鬼白也按藍青丸藥品不倫細繹其旨綽有至理然僅可參究其

法良難效用其法非特藍青鬼白能招誹議即澤蘭湯中麻仁桂蜜湯中蜂蜜或為時禁況妊娠痢閉

中羊脂丸為舉世所昧曷知其為本經主治也

赤散

治產後下痢方

赤石脂 代赭 各三兩

桂心 一兩

右三味治下

篩酒服方寸匕

日三十日愈

黑散 治產後下痢方 麻黃 芫朮 桂心 細辛 甘草 乾漆 右六味治下篩酒服五

撮日再五日愈麥粥下尤佳

黃散 治產後下痢方 黃連 二兩 黃芩 麤蟲 乾地黃 右四味治下篩酒服方寸匕日三十

日愈

龍骨散 治產後痢方 五色龍骨 代赭 赤石脂 黃柏根皮 黃連 二兩 右六味治

下篩飲服方寸匕日三

衍義 赤散治久痢滑泄故取石脂療腹痛腸澼下痢赤白代赭治腹中毒邪女子赤沃漏下皆本經

主治以其味瀼司收故用桂心之辛而散其滯也 黑散治血結於內而腹脹喘逆故用乾漆治絕傷

而破血下行桂心散結積而溫理血氣芫朮治腹中邪而散諸熱毒細辛利室竅而溫散諸寒甘草調

胃氣而兼和藥性麻黃開腠理而宣散逆氣此雖發汗重劑然入於破血導滯劑中亦必助乾漆芫朮

之勢以本經原有破堅癥之治也 黃散治血結於內而發熱故用麤蟲以破堅下血開苓連以治腹

痛下痢地黃以清血中之熱也 龍骨散取連柏苦寒而治崩迫後重以其專散濕熱柏根名曰白檀桓

能治腹中百病代赭石脂龍骨艾葉性味皆瀉專主虛寒脫泄用散不用湯者欲其止瀉故無取於湯

滌也 四方雖同主產後下痢而藥味所主不同是可推其見證也

淋渴第十六方九首

栝蒌湯 治產後小便數兼渴方 栝蒌根 麥門冬 甘草 黃連 二兩 人參 生薑 大棗 枳 桑螵蛸 右八味吹咀以水七升煮取二升半分三服 又方 治產後渴不止方 栝蒌根 四

兩 人參 麥門冬 甘草 乾地黃 大棗 土瓜根 右七味吹咀以水一斗

二升煮取六升分六服

衍義 淋渴往往相兼但淋證未有不渴渴證未必皆淋栝蒌湯二方所主雖皆肺胃虛熱兼用人參

參冬栝蒌甘草大棗生津止渴一兼黃連蟬蛻專主足太陽不能清津而成淋一兼地黃土瓜根專主

雞臍脰湯

治產後小便數方 雞臍脰_二雞腸_三乾地黃_三當歸_三甘草_三厚朴_二人參_{各二}蒲

黃_{四兩}生薑_{五兩}大棗_{二十}

右十味咀咀以水一斗煮臍脰及腸大棗取七升去滓內諸藥煎取

三升半分三服

衍義 熱在小腸不能司膀胱氣化而小便頻數小腸盡處傍通膀胱膀胱滲濡是必小腸有瑕故取

雞之臍脰及腸專利小腸厚朴薑棗泄滯氣人參甘草地黃當歸兼滋氣血蒲黃匡佐臍脰專清膀胱

血熱也世本作麻黃熱既犯腸斷無復用麻黃之理

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生肌而日萎黃師

所不能治方 貝齒_{四枚}燒_{作末}葵子_{一升}石膏_{五兩}滑石_{二兩}右四味以水七升煮二物取二升去滓

內二末及猪脂一合更煎三沸分三服日三不瘥再合服效

衍義 結氣成淋而致引痛溺血時有所下內因堅積可知貝齒專磨堅積葵子滑石石膏輔貝子治

五淋利水道也

石韋湯 治產後卒淋氣淋血淋石淋方 石韋_二黃芩_二通草_二甘草_二榆皮_{五兩}大棗_{三十}葵子_{三十}

白朮_二生薑_三右九味咀咀以水八升煮取一升半分三服_{一方無甘草生薑}

衍義 產後淋證得之卒然無問氣血與石一皆不離於熱石韋大寒本經專主五癰不通兼榆皮葵

子之屬雖云利竅并可散血血散而淋自愈矣產寶以芍藥易朮集驗不用甘草生薑各有主見

葵根湯 治產後淋瀝方 葵根_{二兩}車前子_{一升}亂髮_{燒灰}大黃_{二兩}桂心_{二兩}滑石_{各一}通草_{二兩}生薑_{二兩}

六兩 冬瓜練汁_{合一}右九味咀咀以水七升煮取二升半分三服_{千金翼不}

茅根湯 治產後淋方 白茅根_{一斤}瞿麥_{各四}地脈_{各二}人參_{各三}生薑_{三兩}桃膠_{各一}甘草_{各一}

千金要方卷三

鯉魚齒一兩 右九味吹咀以水一斗煮取二升半分三服

行義 二方同治產後之淋並主膀胱熱結前方用葵根之滑澤兼大黃之寒降以散膀胱之積熱車

前滑石通草乃葵根之佐使桂心亂髮生薑則大黃之反謀瓜練專清胃熱燥渴也 後方用白茅根

之甘寒兼人參之甘溫以溫肺胃氣化腥麥桃膠地脈乃茅根之佐使茯苓甘草生薑則人參之佐輔

鯉齒散堅利水并助桃膠以磨宿積之癖方下所治雖同而新久虛實霄壤

滑石湯 治產後淋方 滑石五兩 通草 車前子 葵子各四兩 右四味治下篩酢漿水服方寸匕稍

加至二匕

竹葉湯 治產後虛渴少氣力方 竹葉三升 生薑 半夏各三兩 大棗十四枚 小麥五合 甘草 茯苓 人

參各一兩 麥門冬五兩 右九味吹咀以水九升煮竹葉小麥取七升去滓內諸藥更煎取二升半一服

五合日三夜一

衍義 淋之與渴雖多相兼淋證未久津液未傷未便作渴渴證雖久無關下焦豈得成淋詳滑石散

竹葉湯二方主治其義自明

離治第十七 方五十八首 灸法九首

破積烏頭圓 治婦人心腹積聚氣悶脹病癰內傷瘀血虛乳餘疾及諸不足勞氣含氣胃滿吐逆其病

頭重結痛小便赤黃大下氣方 烏頭 黃芩 巴豆各半兩 半夏三兩 大黃八兩 戎鹽半兩 麝香 桂

心 苦參八兩 人參 群石一兩 右十一味為末以白蜜一斤 膠半斤 和持三萬 升九 如升 子隔 官分 酒服五凡安卧須臾當下黃者小腹積也青者病也白者內風也如水者留飲也膏如粥汁隔上邪

氣也血如腐肉者傷也赤如血者產乳餘疾也如蟲刺者蠱也既下必渴渴飲粥湯飢食稀糜三日後富溫食食必肥濃三十日平復

能直攝長靈桂心佐靈蟲以破積血黃佐半夏以破積痰或靈佐消石以破積水人參統領諸藥為之主帥服後觀其所下過半便與糜粥調養經謂大積大聚毒可死也衰其大半而止毋犯下文三字

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血方 竹茹二升 人參 芍藥 桔梗 芎藭 當歸 甘草 桂心 各一匙 地黃四兩 占九味或咀以水一斗煮取二十分三服

行義 前治勞氣食氣逆氣此治汗血吐血尿血下血竹茹為臣血發渴專藥芍藥芍地為滋血專藥

人參甘草為扶胃專藥桂心專行四物之滯桔梗專助人參之力非若前證之有氣逆血結合行攻擊也

治婦人自少志頭疼眩暈方 石南 一方用 細辛 天雄 茵芋 各二 薯蕷 防風 貫衆 獨活 薤白 各四 乾薑 山茱萸 各三 右十一味或咀以酒三斗漬五月初飲二合日三服後稍稍加之

行義 一派皆搜風猛劑漬之以酒稍取微酣深得緩急相需之妙用但茵芋近世罕得不妨以鬼白代之

治婦人經服硫黃丸忽患頭痛項冷冷厥又心胸煩熱眉骨眼背癢病或有時生瘡喉中乾燥四體痛癢

方 枯薑根 麥門冬 龍膽 各三 大黃 二兩 杏仁 二升 土瓜根 八兩 右六味為末蜜丸如梧子飲

服十九日三後漸加之

行義 火逆則頭痛火鬱則項冷皆硫黃毒伏之候火性上炎而熏灼肺胃故用枯薑根麥門冬滋其

上燥大黃龍膽疎其下竅杏仁專散結氣土瓜根專攻結血蜜丸緩進漸加以化熱毒也

治婦人患癰接時如有三五個而作水聲殊不得寢食常心悶方 牽牛子三升治下篩飲服方寸七日

一服三十服後可服好硫黃一兩

行義 先行瀉滌次與溫散然非按之作水聲者使非水癰慎勿誤投苟非氣壯實實亦難藥治

治婦人忽與鬼交通方 松脂 二兩 雄黃 末 一兩 右二味先煑松脂乃內雄黃末以虎爪攪令相得藥成

取如雞子中黃夜臥以著燿籠中燒令病人取自昇其上以被自覆惟出頭勿令過熱乃令氣得泄也

衍義 松脂雄黃皆辟邪之物燒煉隱處令絕其交通之地

厚朴湯 治婦人下焦冷滯膀胱腎氣損弱自汗小便俱出方 厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸

去滓取桂一尺為末內汁中調和一宿勿食旦頻服之

衍義 下焦虛冷真陽式微不能收廓大氣此方得之

溫經湯 治婦人小腹痛方 茯苓_{六兩} 土瓜根 芍藥_{各三兩} 薏苡仁_{半升}

一宿旦加水七升煮取二升分再服 右四味咀咀以酒三升漬

衍義 婦人小腹痛有熱有寒此以經癸不調而痛雖曰溫經殊非虛冷之謂酒浸煎服即所以溫之也

半夏厚朴湯 治婦人胸滿心下堅咽中帖帖如有炙肉嚥吐之不出咽之不下方 半夏_{一升} 厚朴_{三兩}

茯苓_{四兩} 生薑_{五兩} 蘇葉_{五兩} 右五味咀咀以水七升煮取四升分四服日三夜一不瘥更服

一方無蘇葉生薑

衍義 婦人火鬱痰結於咽而致嘔吐不下用半夏厚朴溫散專取金匱成法

治婦人氣方 平旦服烏牛尿日一止

衍義 水氣浮腫而用烏牛之屎殺蟲利水與鹽尿同功而烏牛更益脾腎

昆布圓 治婦人胸中伏氣方 昆布 海藻 芍藥 桂心 白石英 欬冬花 桑白皮 人參_各

兩 栝子仁 茯苓 鍾乳_{各二兩} 紫苑 甘草_{各一兩} 乾薑_{六兩} 吳茱萸 五味子 細辛_{各一兩} 杏仁_{一百粒}

橘皮 蘇子_{各五} 右五十味為末蜜丸如梧子酒服二十九日再加至四十丸

衍義 痰氣伏膈胸中如陰靈噎日苟非辛溫皆進何以宣布五陽而溫散藥中獨不及附子者恐其

壯火食氣更增擾亂中州也

治婦人無故憂患胸中迫塞氣不下方 芍藥 滑石 黃連 石膏 山茱萸 前胡_{各一兩} 大黃

麥門冬 細辛 生薑_{各一兩} 半夏_{一兩} 桂心_{半兩} 右十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九日加至三

十九日三服

衍義 前以胸中大氣不布故宜溫補助陽此以胸中痰氣迫塞故宜滌熱存陰同一中氣不舒而寒熱補瀉天淵

治婦人斷產方 盤子故紙方一尺燒為末酒服之終身不產

治勞損產後無子陰中冷溢出子門閉積年不產身體寒冷方 防風半兩 桔梗三十 人參兩 薑蒲半

夏 丹參 厚朴 乾薑 紫苑 杜蘅八錢 秦艽 白薇 牛膝 沙參各半 右十四味為末白蜜

和丸如小豆食後服十五丸日三服不知加至二十九有娠止夫不在勿服之服藥後七日方合陰陽

衍義 是必產後房勞虛風內動風虛相搏而經閉不行濁溢子門故用防風白薇杜蘅秦艽以逐內

風半夏厚朴以滌痰氣牛膝丹參以通積血沙參紫苑桔梗菖蒲輔乾薑人參以溫胃氣勿疑防風等

味為發散用也

五茄酒 治產後癱瘓玉門冷方 五茄皮一斤 蛇床子一斤 杜仲一斤 乳床半升 乾地黃二兩 枸杞

子一升 丹參二兩 乾薑三兩 天門冬四兩 右九味咬咀以絹袋子盛酒二斗漬三宿一服五合日再

稍加至一升佳

衍義 五茄皮專發醪醴性味諸藥得此功力倍常不獨專溫玉門也

治子門閉血聚腹中生肉癰臟寒所致方 乾漆半斤 生地黃汁三升 生牛膝汁一升 右三味先搗漆

為散內汁中攪微火煎為丸如梧子酒服三丸日再覺腹中痛食後服之

衍義 漆灰破血不得地黃牛膝之潤與酒澤之魚無異矣

治產後勞玉門開而不開方 疏黃四兩 吳茱萸半兩 兔絲子六兩 蛇床子一兩 右四味為散以水一

升煎二方寸已洗玉門日再洗

治產後陰道開而不開方 石灰一斗熬令燒草以水二斗投之適寒溫入汁中坐漬之須臾復易坐如

常法甚効

行義

玉門開而不閉肝氣過泄腎氣不藏故用硫黃萊莢以溫之兔絲蛇床以補之石灰熬漬以蒸之勞在患處故無取於內治

黃芩散 治婦人陰脫方

黃芩 蠟皮 當歸 芍藥 牡蠣 竹皮 各半 右

七味治下篩飲服方寸匕日三服舉重房勞冷食

硫黃散

治同前

硫黃 烏鰂骨 五味子 三味 右三味治下篩以粉其上良日再三粉之

當歸散

治同前

當歸 黃芩 蠟皮 牡蠣 芍藥 右五味治下篩酒服方寸匕

三服舉重良

治產後陰下脫方

蛇床子一升布裏炙熨之亦治產後陰中痛○又方 燒人屎為末酒服方寸匕日

三○又方

燒弊簾頭為灰酒服方寸匕○又方 蟹頭五枚為末以井花水服方寸匕日三○又方

皂莢

半兩 半夏 大黃 細辛 蛇床子 右五味治下篩用薄絹囊盛大如指內陰中日二

易却瘥

又方 吳茱萸 蜀椒 椒 戎鹽 子大 右三味皆熬令變色為末以綿裹如半雞子大內

陰中日一易二十日瘥

治陰下挺出方

蜀椒 烏頭 白朮 右三味為末以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱

易之日一度明旦乃復著七日愈

治婦人陰下脫若脫肛方

羊脂煎記適冷暖取塗上以鐵精敷脂上多少令調以大灸布令暖熱肛上

漸進內之然後末磁石酒服方寸匕日三

行義

陰脫與子閉不開不同勞則泄而不收脫則虛熱下墜故以黃芩竹皮清理濕熱當歸芍藥調

和血氣蠟皮治陰腫下血牡蠣治赤白帶下狐莖取其善縮入腹所患最急恐藥力紆緩更須粉以外

治漏以內助以無狐莖并去竹皮若產後虛脫陰腫蛇床熨之蟹頭收之皂莢大黃半夏細辛蛇床專

散瘀腫菜蔓蜀椒或鹽專治風冷蜀椒烏頭白芨專療陰挺羊脂專助滑澤升散膿精內服磁石吸之使內而不下也

當歸湯 治產後臍中風冷陰腫痛方 當歸 獨活 白芷 地榆各三兩 敗醬千金翼不用 礬石各三兩 右

六味以水一斗半煮取五升適冷暖稍稍洗陰日三〇又方 熱搗桃仁傳之良日三度

行義 產後陰腫無非風熱於血獨活白芷散風當歸地榆散血敗醬解毒礬石消腫如法洗之最良

熟搗桃仁傳之亦得總取散血消腫之功用

陰瘡膏 治男女陰瘡方 米粉一升 芍藥 黃芩 牡蠣 附子 白芷各十兩 右六味咬咀以不中

水猪膏一斤微火上煎三上三下候白芷黃膏成絞去滓內粉和令相得傳瘡上併治口瘡

治陰中痛生瘡方 羊脂一升 杏仁一升 當歸 白芷 芍藥各四兩 右五味為末以羊脂和諸藥內鉢

中置甑內蒸之三升米頃藥成取如大豆許綿裹內陰中日一

治男女陰中瘡濕癢方 黃連 梔子 甘草 黃柏各一兩 蛇床子二兩 右五味治下篩為細末以粉

瘡上無汁以猪脂和塗之深者用綿裹內瘡中日二

治陰瘡方 蕪荑 芎藭 黃芩 甘草 礬石 雄黃 附子 白芷 黃連各六兩 右九味咬咀取

猪膏四兩合煎傳之

治陰中瘡如蟲行狀方 礬石十八兩 芎藭 一兩 丹砂 少許 右三味治下篩取綿裹藥著陰中蟲自死

治陰中瘡入骨方 大黃 黃芩 黃耆各一兩 藥 半兩 元參 丹參各八兩 吳茱萸三十兩 右七味治下

篩酒服方寸匕日三〇又方 狼牙兩把以水五升煮取一升洗日五六度

治男女陰蝕略盡方 蝦蟆 兔屎 右二味等分為末取傳瘡上〇又方 蛇床子一方用 當歸 芍

藥 甘草各一兩 地榆 三兩 右五味咬咀以水五升煮取二升洗日三夜二〇又方 蒲黃 一升 水銀

一兩 右二味研以粉其上〇又方 肥猪肉十斤以水煮取熟去肉盆中浸之冷易不過三兩度亦

千金要方 卷三

治陰中瘡有蟲

行義

陰瘡多由濕熱所致濕盛則多瘡熱盛則多痛濕熱交併則瘡痛啞腫甚則腐爛生蟲蟲亦濕熱所化淫熱不禁者多此陰瘡膏中芍藥和血痺寒熱黃芩主惡瘡疽蝕壯蠅治赤白帶下附子破癥

堅積聚白芷瘡陰腫寒熱煎用猪脂滋血解毒和以米粉止痛生肌專治附子透入陰經也陰中痛生瘡用羊脂滋血杏仁殺蟲白芷散腫芎歸和營專取羊脂引入蟲口男女陰中濕瘡雖用連柏苦

燥山梔甘草清火不得蛇牀不能治男子陰痿濕瘡婦人陰中腫痛陰瘡用蕪荑礬石治瘡芎歸和血丹砂

連散火甘草消腫芎歸和血不得附子不能解陰毒陰中如蟲行專用礬石治瘡芎歸和血丹砂

鎮攝陰火也陰瘡入骨厥陰火鬱不得發泄也非大黃黃芩不能導之使下非吳茱萸不能通之使散非蒼朮二參不能解散鬱熱也又方單用狼牙為殺蟲解毒專藥男女陰蝕血肉略盡諒非

草根木實可瘡故取蝦蟆蝕月之義以治陰蝕太陰月兔之屎以逐陰穢非精明陰陽至理者難以體此又方用歸芎甘草地榆和血止痛不得蛇牀無以化濕熱生虫之隱疾又方用蒲黃散血

水銀殺蟲亦陰蝕之峻藥猪肉煮湯浸洗雖能止痛安蟲然侵後須加傅治處杜復發之虞以上諸治須詳濕盛熱盛有蟲無蟲隨證採用可也

治女人交接輒血出方桂心伏龍肝各二右二味為末酒服方寸匕立止

治室女交接陽道違理及為他物所傷血出流離不止方取釜底墨少許研胡麻以傅之○又方燒

繭絮灰傅之○又方燒青布并髮灰傅之立愈

治合陰陽輒痛不可忍方黃連一兩牛膝甘草各一右三味咬咀以水四升煮取二升洗日四度

治婦人傷於丈夫四體沉重噓吸頭痛方香豉葱白各一生地黃八兩生薑四兩甘草二兩芍藥三

兩右六味咬咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重作慎房事生薑甘草

行表 女人交接出血多由衝脈受傷方用桂心辛溫散血伏龍肝暖臟生肌故為首推 次用釜底

墨亦能止血生肌兼取胡麻之潤以緩痛也 蘭絮灰青布灰髮並能止血 交合輒痛經脈受傷而

蘊熱故用黃連散火牛膝和血甘草緩痛 傷於丈夫而體重頭痛用葱白香豉之屬與女勞復之治

相類即有客邪發熱亦不出此 玉能滅癥亦能止痛但取以通氣化兼用白朮以溫肉理當歸以和血

脈旋落以滋精髓澤瀉佐白朮以通氣化皆交接過傷之專法

治動胎見血腰痛小腹疼月水不通陰中腫痛方 蒲黃 當歸_{各二兩} 葱白_切 吳茱萸 阿膠_{各一兩}

右五味以水九升煮取二升半去滓內膠令烱分三服

治妊娠為夫所動欲死單行竹瀝汁方 取淡竹斷兩頭節火燒中央器盛兩頭得汁飲之立效

桑根白皮湯 治傷于丈夫苦頭痛欲嘔心悶方 桑根白皮_{半兩} 乾薑_{二兩} 桂心_{五寸} 大棗_{二十枚} 右

四味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服通衣無冷汗出

治嫁痛單行方 大黃十八銖取好酒一升煮三沸頓服之佳

治小戶嫁痛連日方 甘草_{三兩} 芍藥_{半兩} 生薑_{銖十八} 桂心_{六銖} 右四味咬咀以酒二升煮三沸去滓

盡服神効○又方 牛膝五兩以好酒三升煮取一升半去滓分三服

治小戶嫁痛方 烏賊魚骨燒為屑酒服方寸匕日三

行義 動胎見血與因病而胎息不安之治不同此方以蒲黃散血當歸和血阿膠止血吳茱萸下氣

止痛葱白溫血安胎而無母病之糾纏也 竹瀝寒降惟妊娠肥盛多疾胎逆喘滿者為宜 而腎氣

過勞胎氣上逆喘悶欲嘔者則以薑桂收攝虛陽太東安和脾氣桑根白皮開泄逆上喘滿之氣 酒

煮大黃既能消腫亦能泄大惟氣盛壯實者為宜 小戶嫁痛而滑瀉惡寒翁翁發熱用桂枝湯本非

表邪但取和營故減桂枝以下體傷不宜更實中土故去太棗○又方 單用牛膝酒煮專和血脉之

傷損 烏賊骨為氣竭肝傷厥陰散血之專藥且味鹹兼走少陰故小戶受傷為之的藥

治陰寬大令窄小方 兔屎 乾漆各半 鼠頭骨二枚 雌雞肝二枚 右四味為末蜜丸如梧子月初

七日合時著一丸陰頭令徐徐內入三日知十日小五十日如十五歲童女一本無乾漆有礬石

行氣 婦人土體重平知後益虧同乎月服屈夫玉月寬窄雖生成就多有交接逆勞傷氣經終不

能收持者非力為圖治胡能復其本來故取月兔之遺同氣相引以療積陰之固疾乾漆之治絕傷以

破宿昔之瘀滯鼠頭骨之善竄少陰以利陰曲之機竅生雞肝之直達厥陰以修廢弛之闕闕共襄破

宿生新之功若不因敗損無瘀濁下溢者則當從去乾漆易礬石例治證雖根襲略無及于狎昵之味

智圓行方于此可做

治陰冷令熱方 內食茱萸子牛膽中令滿陰乾百日每取二七枚綿裹之當嚼令碎內陰中良久熱如

火

衍義 陰冷乃肝氣失職生陽不能下達至陰故用食茱萸溫散厥陰之味製以牛膽并清濁陰之不

潔然須日用無間庶克有濟兼進八味腎氣尤為得力

灸法

月水不利責脈上下并無子灸四滿三十壯穴在丹田兩邊相去各開寸半丹田在臍下二寸是也 婦

人胞落頰灸臍中三百壯 又灸身交五十壯三報在臍下月橫交中 又灸背脊當臍五十壯 又灸

玉泉五十壯三報 又灸龍門二十壯三報在玉泉下女人入陰內外之際此穴卑令廢不針灸 婦人

胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年壯三報 婦人陰冷腫痛灸歸來三十壯三報俠玉泉五寸是其

穴 婦人欲斷產灸右踝上一寸二壯即斷

玉泉五十壯三報 又灸龍門二十壯三報 在玉泉下女入入陰內外之際此穴卑今廢不針灸 婦人
胞下垂注陰下脫灸橫玉泉三寸隨年壯三報 婦人陰冷虛痛灸歸來三十壯三報 使玉泉五寸是其
穴 婦人陰斷灸橫玉泉上一寸二壯即斷

5957c

1915

v. 1 no. 2-3